

INSTITUT DES PARCS NATIONAUX  
DU CONGO BELGE

INSTITUUT DER NATIONALE PARKEN  
VAN BELGISCH CONGO

---

# Exploration du Parc National Albert

MISSION J. LEBRUN (1937-1938)

FASCICULE 6

---

# Exploratie van het Nationaal Albert Park

ZENDING J. LEBRUN (1937-1938)

AFLEVERING 6

**MOUSSES**

PAR

F. DEMARET & V. LEROY  
(Bruxelles)



BRUXELLES  
1944

BRUSSEL  
1944

# MOUSSES

PAR

F. DEMARET & V. LEROY  
(Bruxelles)

## INTRODUCTION

Au cours de sa mission au Parc National Albert en 1937-1938, M. J. LEBRUN a recueilli 232 numéros de mousses dont l'étude apporte une intéressante contribution à la connaissance de la flore bryologique de l'Est de notre Colonie.

La plupart des spécimens proviennent de la région méridionale du Parc National Albert. Leur étude nous a permis de reconnaître 94 espèces et 14 variétés, dont 45 constituent des acquisitions nouvelles pour le Congo Belge; l'une d'elles, *Squamidium chlorothrix* (C. MÜLL.) BROTH. se rapporte à un genre qui n'était pas encore représenté dans notre Colonie. Parmi ces éléments, 11 espèces et 3 variétés sont nouvelles pour la science. En outre, les diagnoses de *Mniobryum pergracile* THÉR. et P. DE LA V. et de *Macromitrium Bequaerti* THÉR. et NAV. ont pu être complétées grâce à l'état bien fructifié des échantillons.

Nous avons groupé les spécimens suivant les sous-districts phytogéographiques établis par W. ROBYNS (1). Les récoltes se répartissent comme suit : 87 numéros dans le sous-district de la plaine de lave et des formations sclérophylles, 85 dans le sous-district des volcans, groupe central, 29 dans le

(1) ROBYNS, W., Aperçu général de la végétation [*Asp. Vég. Parcs Nat. Congo Belge*, sér. I, Parc. Nat. Albert, I, fasc. 1-2, pp. 10-15 (1937)].

sous-district des volcans, groupe occidental, 10 dans le sous-district de la plaine de la Rutshuru.

Certains numéros ont été prélevés en dehors des limites du Parc National Albert : 16 dans la région de Rutshuru, 5 entre Lubero et Butembo. En raison de leurs stations limitrophes, nous les citons également dans ce travail; ils font respectivement partie du sous-district de la dorsale orientale et du sous-district de la dorsale occidentale.

L'extension de l'aire géographique de quelques espèces est particulièrement intéressante; citons : *Archidium capense* HORNSCH et *Tortula torquatifolia* (GEH.) DIX. connues jusqu'à présent, la première en Afrique du Sud, la seconde en Rhodésie et en Afrique du Sud-Ouest, et *Stableria tenella* (MITT.) BROTH., originaire du Chili.

Dans la citation des spécimens, chaque numéro de récolte est accompagné des abréviations (fr.) ou (st.), selon que la plante est fructifère ou stérile. Quand nous avons affaire à un mélange, nous l'indiquons chaque fois entre crochets, à la suite des observations écologiques.

Nous sommes heureux de témoigner notre reconnaissance :

à MM. POTIER DE LA VARDE et THÉRIOT, pour la bienveillance avec laquelle ils ont examiné nos spécimens nouveaux ou critiques; grâce à leur aide et à leur dévouement, nous sommes parvenus à mener ce travail à bonne fin;

à M. HERZOG, pour les renseignements qu'il nous a obligeamment fournis;

à M. ALLORGE, qui n'a pas hésité, dans les circonstances actuelles, à nous envoyer certains échantillons de comparaison du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris;

à M. W. ROBYNS, directeur du Jardin botanique de l'État, pour les conseils judicieux qu'il nous a prodigués;

enfin à M. J. LEBRUN, pour les précisions d'ordre géographique qui nous ont été très utiles.

## SPHAGNACEAE

## SPHAGNUM EHRH.

**Sphagnum planifolium** C. MÜLL., Flora, p. 415 (1887).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : grand marais de Kikeri, au pied du Mikeno, alt. 2.200 m., août 1937, n° 7240; id., alt. 2.200 m., tourbière, août 1937, n° 8520.

Cette espèce, probablement répandue en Afrique équatoriale et tropicale, est signalée jusqu'à présent en Afrique Équatoriale française et dans l'Uganda; elle est nouvelle pour notre Colonie où l'on ne connaissait que sa variété *congoanum* WARNST.

## ANDREAEACEAE

## ANDREAEA EHRH.

**Andreaea kilimandjarica** PAR., Ind. Bryol., p. 30 (1894).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : sommet du Karisimbi, alt. 4.507 m., sur blocs de lave, avec lichen fruticuleux, vert-de-gris, rampant au-dessus des mousses, août 1937, n° 7428 (fr.); sommet du Karisimbi, alt. 4.507 m., blocs de lave, en plaques, août 1937, n° 7430 B (fr.), 7433 B (st.), [tous deux en mélange avec *Mielichhoferia ruwenzorensis* THÉR. et NAV.].

Cette espèce a été signalée auparavant au Kilimandjaro, au mont Kenia, au Ruwenzori et au Karisimbi.

## FISSIDENTACEAE


## FISSIDENS HEDW.

**Fissidens vesiculosus** DEMAR. et LEROY, sp. nov.

(Fig. 1-4.)

Caespites sat densi, atro-virides. Caulis simplex, erectus, 5-9 mm. altus, foliis 10-15 jugis, circa medio folii latitudinis remotis. Folia circa 1,25-1,50 mm. × 0,30-0,40 mm., inferiora breviora, crispato-undulata marginibus et apice incurva siccitate, erecto-patentia madore, lingulata, acuta, marginibus paulum sinuosis, apice leniter curvata; costa pallido-flava, excurrens, interdum paulum apice sinuosa; lamina vera ad 2/3 longitudinis folii producta, semiaperta, inferne rotundata et ad 3/4 latitudinis caulis producta; lamina apicalis lanceolata; lamina dorsalis inferne 1/4 latitudinis folii attingens, plerumque anguste et subito in caulem decurrens;

limbidium pallide flavum, in tribus laminis integrum, sub apicem interdum paululum sinuosum, uni- vel biseriatum, ad basin laminae verae 4-6 seriatum; cellulae mediae irregulariter hexagonae, 5-9  $\mu$ , laeves sed vesiculosae, basi majores, subrectangulares. Caetera desunt.



*Fissidens vesiculosus* DEMAR. et LEROY.

FIG. 1. — Plante ( $\times 5$ ).      FIG. 2. — Fragment de tige ( $\times 25$ ).  
 FIG. 3. — Sommet d'une feuille ( $\times 300$ ).      FIG. 4. — Base de la lame vraie ( $\times 300$ ).

(J.-M. Lerinckx del.)

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLLES :  
 lac Mugunga, alt.  $\pm 1.500$  m., berges rocheuses, novembre 1937, n° 8826 (st.).

OBSERVATION. — Cette espèce de la section *Bryoidium* est à rapprocher de *F. leucocinctus* HAMP. par ses cellules vésiculeuses, mais s'en distingue par la nervure excurrente, la lame vraie beaucoup plus ouverte (chez *F. leucocinctus* HAMP. la lame vraie est en général fermée ou à peine ouverte) et la lame dorsale plus largement décurrente sur la tige. On ne peut la

rattacher à *F. lineari-limbatus* C. MÜLL. dont les feuilles sont entourées, suivant la diagnose, d'un limbidium extrêmement étroit. La largeur de la lame dorsale à la base de la feuille la différencie également de *F. Breutelii* SCHPR dont la lame dorsale serait « ad basin folii angustissima ».

**Fissidens sciophyllus** MITT., Trans. Linn. Soc., XXIII, p. 55, tab. VI, fig. 13 (1860).

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi, alt. 1.050 m., forêt, sur le sol, février 1938, n° 9831 (st.); Rwindi, alt. 1.050 m., forêt, épiphyte, en tapis, février 1938, n° 9832 A (fr.), [en mélange avec *Rhacopilum spelunca* C. MÜLL.].

A notre connaissance, cette espèce n'a jamais été signalée au Congo; elle était connue d'Afrique centrale et de l'Uganda.

## ARCHIDIACEAE

### ARCHIDIUM BRID.

**Archidium capense** HORNSCH., Linn., XV, p. 135 (1841).

(Fig. 5-6.)

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Kanyasembe, alt. 1.000 m.,



5



6

*Archidium capense* HORNSCH.

FIG. 5. — Plante ( $\times 7.5$ ).      FIG. 6. — Feuille ( $\times 75$ ).

(J.-M. Lerinckx del.)

savane, en petites pelotes, décembre 1937, n° 9229 (fr.); Rwindi, alt. 1.050 m., savane, sur le sol, en petites pelotes, février 1938, n° 9835 (fr.) (fig. 5-6).

Cette espèce n'était signalée jusqu'à présent qu'en Afrique du Sud; elle est nouvelle pour le Congo Belge.

OBSERVATION. — D'après la description originale, les cellules des feuilles caulinaires sont lâches et subquadrangulaires. Suivant SIM, les cellules sont étroites et quadrangulaires, en opposition à celles d'*A. alternifolium* (DICKS.) SCHPR, où elles sont très lâches et rhomboïdales. Les cellules des petites feuilles inférieures du n° 9835 répondent à la description, mais les feuilles plus grandes du sommet des tiges ont des cellules plus allongées (6×1) et rhomboïdales. Vers le centre, de part et d'autre de la nervure, ainsi que dans la partie acuminée, vers les bords, elles deviennent plus petites, plus denses et carrées.

## DICRANACEAE

### CAMPYLOPODIUM (C. MÜLL.) BESCH.

**Campylopodium euphorocladum** (C. MÜLL.) BESCH., Ann. Sc. Nat., 5° sér., XVIII, 3, p. 189 (1873).

*Angstroemia euphoroclada* C. MÜLL., Syn. Musc. Frond. I, p. 429 (1849).

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE : entre Lubero et Butembo, alt. 1.800 m., talus argileux dans la forêt, en petites pelotes, février 1938, n° 9882 (fr.).

Cette espèce à large distribution est connue de Java, Tahiti, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Madère, Afrique tropicale orientale et, au Congo Belge, du Ruwenzori.

### CAMPYLOPUS BRID.

**Campylopus stramineus** (MITT.) JAEG. in JAEG. et SAUER, Ad. Fl. Musc., II, p. 646 (1877-1878).

*Dicranum stramineum* MITT., Journ. Proc. Linn. Soc., VI, p. 148 (1863).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE OCCIDENTAL : versant est du Nyiragongo, cratère du Shaheru, alt. 2.700 m., bosquet à *Hypericum*, en grosses pelotes, janvier 1938, n° 9359 (st.).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : versant nord du Karisimbi, entre Kabara et le Rukumi, alt. 3.100-3.300 m., étage des *Hagenia*, épiphyte sur *Hagenia*, août 1937, n° 7384 B (st.), [en mélange avec *Zygodon dioicus* BROTH]; versant nord du Karisimbi, plateau du Rukumi, alt. 3.700 m., massif d'Ericacées, épiphyte sur *Philippia*, en gros coussinets, [en mélange avec *Anastrophyllum* sp.], août 1937, n° 7388 (fr.); versant nord du Karisimbi,

alt. 3.900 m., bosquet de *Senecio*, épiphyte sur *Senecio*, en coussinets, août 1937, n° 7398 A (st.), [en mélange avec *Hypnum cupressiforme* L.]; versant nord du Karisimbi, alt. 3.900 m., bosquet de *Senecio*, épiphyte sur *Senecio*, août 1937, n° 7400 A (fr.), [en mélange avec *Orthotrichum affine* SCHRAD., *Daltonia Mildbraedii* BROTH. var. *laevis* DEMAR. et LEROY et *Zygodon intermedius* BR. et SCHPR]; versant nord du Karisimbi, alt. 4.250 m., alpages et bosquets, terrestre ou épiphyte, en pelotes épaisses, août 1937, n° 7412 (st.), sommet du Karisimbi, alt. 4.507 m., blocs de lave, en coussinets denses, août 1937, n° 7431 (st.).

Cette espèce est largement répandue : Cameroun, Kenia, Uganda; Congo Belge : Ruwenzori et région des volcans.

OBSERVATION. — Le n° 7398 A est un échantillon à feuilles longues (environ 9 mm.), qui rentre dans les formes que BROTHERUS avait dénommées *C. substramineus* BROTH. et que, avec DIXON (*Smiths. Misc. Coll.*, LXIX, 2, p. 10, 1918) nous rangeons dans *C. stramineus* (MITT.) JÆG.

**Campylopus denticuspes** BROTH. in MILDBR., *Wiss. Ergebn. Deutsch.-Zentr.-Afr. Exp. 1907-1908*, II, p. 140 (1914).

(Fig. 7.)

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : entre Busogo et Rusayo, alt. 1.800 m., forêt sclérophylle, sur tronc mort, en



7

*Campylopus denticuspes* BROTH.

FIG. 7. — Coupe transversale d'une feuille (×150).

(J.-M. Lerinckx del.)

tapis continus, novembre 1937, n° 8667 A (st.), [en mélange avec *Hypnum cupressiforme* L.].

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE OCCIDENTAL : versant est du Nyiragongo, alt. 2.800 m., étage frutescent sclérophylle, en pelotes, novembre 1937, n° 8731 (st.); id., alt. 3.300-3.470 m., rigoles dans la lave, en pelotes, novembre 1937, n° 8762 (st.); volcan Nyiragongo, bord du Shaheru, alt. 2.700 m., parc à *Hagenia*, épiphyte à la base d'un tronc d'*Hagenia*, novembre 1937, n° 8775 A (st.); versant est du Nyiragongo, cratère du Shaheru, alt. 2.700 m., bosquet d'*Hypericum*, en tapis, janvier 1938, n° 9355 (st.) (fig. 7).



SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : versant nord du Kari-simbi, plateau de Rukumi, alt. 3.700 m., bosquets de *Philippia*, épiphyte sur *Senecio*, en pelotes, août 1937, n° 7463 D (st.) [mêlé à *Hypnum cupressiforme* L., *H. cupressiforme* L. var. *resupinatum* (WILS.), SCHPR et *Zygodon seriatus* THÉR. et NAV.].

Cette espèce n'est connue jusqu'à présent que de la région des volcans et du Ruwenzori.

**Campylopus introflexus** (HEDW.) MITT, Journ. Linn. Soc. (Musc. Austr. Am.), XII, p. 84 (1869).

*Dicranum introflexum* HEDW., Sp. Musc., p. 147 (1801).

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : Gahojo, alt. 1.500 m., cendrées volcaniques de 1904, en plaques, août 1937, n° 6924 (st.); id., alt. 1.500 m., cendrées volcaniques, août 1937, n° 6931 (st.) (avec lichen); entre Kingi et Nyefunze, plaine de lave entre le Nyamuragira et le Nyiragongo, alt. 1.850-2.050 m., forêt sclérophylle, bloc de lave, en touffes, octobre 1937, n° 7845 (fr.); entre Mihanga et Kibumba, plaine de lave entre le Nyamuragira et le Nyiragongo, alt. 2.350 m., coulée de lave, octobre 1937, n° 7887 (st.); Kikomero, alt. 1.850 m., plaine de lave, au fond d'une crevasse humide et ombreuse, novembre 1937, n° 8491 A (st.), [en mélange avec *Macromitrium Mannii* JAEG. et *Hypopterygium laricinum* (HOOK.) BRID.]; id., alt. 1.850 m., plaine de lave, en tapis sur les blocs de lave, surtout sur les parois, novembre 1937, n° 8492 A (fr.), [en mélange avec *Schlotheimia Bequaerti* THÉR. et NAV. et *Macromitrium Bequaerti* THÉR. et NAV.]; id., alt. 1.850 m., plaine de lave, en tapis sur les blocs de lave, novembre 1937, n° 8494 (fr.); Gahojo, alt. 1.550 m., cendrées du Nahimbi, novembre 1937, n° 8561 (st.); entre Kingi et Busogo, alt. 1.700-1.800 m., clairière herbeuse dans la forêt sclérophylle, bloc de lave, en petites pelotes, novembre 1937, n° 8643 (st.).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE OCCIDENTAL : versant est du Nyiragongo, cratère du Shaheru, alt. 2.100 m., alpage, sur une plaque de lave, en tapis, novembre 1937, n° 8797 (st.); id., cratère du Shaheru, alt. 2.700 m., alpage, en tapis, janvier 1938, n° 9376 (st.).

Cette espèce est largement répandue : Europe occidentale et méridionale, Algérie, Madère, Canaries, Açores, Cameroun, îles occidentales et orientales africaines, Afrique du Sud, Amérique septentrionale, centrale et méridionales, Océanie; Congo Belge : Masisi, Kisenyi, Ruwenzori et région des volcans.

OBSERVATION. — Les feuilles du n° 8643 et principalement les feuilles jeunes, sont, en général, dépourvues de pointe hyaline.

**DICRANUM** HEDW.

**Dicranum acanthoneuron** C. MÜLL., Flora, p. 474 (1890).

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLS : entre Mihanga et Kibumba, plaine de lave entre le Nyamuragira et le Nyiragongo, alt. 2.350 m., coulée de lave, en pelote, octobre 1937, n° 7888 A (st.), [en mélange avec *Leptodontium squarrosum* (HOOK.) PAR.].

Signalé jusqu'à présent au Kilimandjaro, au Kenya et dans la région des volcans.

**CALYMPERACEAE****SYRRHOPODON** SCHWAEGR.

**Syrrhodon acrodontus** DEMAR. et LEROY, sp. nov. (sect. *Crispati*).


(Fig. 8-11.)

Superne sordide viridis, inferne rufescens, laxe caespitosus. Caulis ad 2 cm. altus. Folia siccate crispata, madore erecto-patentia vel patentia, superiora circa 2-2,75 mm.  $\times$  0,30 mm., inferiora minora, e basi vaginante longiuscule obovata 2/5 folii longitudinis attingente, undulata, conduplicata, anguste lingulata, circa 0,25 mm. lata, acuta, interdum subobtusata, summo dentata; costa inferne 30-40  $\mu$  crassa, infra apicem evanescens, superne dorso spinosissima; cancellinae hyalinae medium folii attingentes 20-30  $\mu$  latae, 4-5 seriatas, quarum externae 10-14  $\mu$  latae; cellulae chlorophyllosae laminales opacae, papillosae, subhexagonae, 8  $\mu$  latae; limbidium in vagina 4-5 seriatum cellulis 2-4  $\mu$  latis, secus margines laminae 3-4 seriatum cellulis linearibus, paulo ante apicem evanescens.

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE OCCIDENTAL : entre Kibumba et le Nyamuragira, alt. 1.800-2.000 m., forêt sclérophylle, épiphyte sur un tronc, août 1937, n° 7082 B (st.), [en mélange avec *Hypnum cupressiforme* L. et *Leptodontium squarrosum* (HOOK.) PAR.].

OBSERVATION. — M. POTIER DE LA VARDE, à qui nous avons communiqué cet échantillon, a pu le comparer aux espèces voisines de la Section et nous a très obligeamment fait part de ses observations.

Notre espèce est distincte de *S. linealis* DIX. et THÉR. et de *S. oxyphyllus* P. DE LA V. par le port plus robuste et la largeur des lames foliaires. Elle offre cependant des affinités avec la dernière en raison de l'apex denté-épineux. Ce caractère la rapproche de *S. Lepervanchii* BESCH., mais on observe chez celle-ci une nervure nettement épineuse sur la face dorsale dans tout le tiers supérieur et des limbidia dentés depuis le sommet de la gaine jusqu'à la pointe de la feuille; de plus, la gaine est plus large et non rétrécie inférieurement, les cancellines sont plus grandes et la nervure est



*Syrrhopodon acrodontus* DEMAR. et LEROY.

FIG. 8. — Feuille ( $\times 30$ ).

FIG. 9. — Sommet d'une feuille vue de dos ( $\times 425$ ).

FIG. 10. — Limbidium de la lame ( $\times 425$ ).

FIG. 11. — Limbidium de la gaine ( $\times 425$ ).

(Demaret et Leroy del.)

eclerée chez *S. Lepervanchii*. L'espèce du Parc Albert s'apparente à *S. Isleanus* BESCH. par la nervure lisse, mais s'en distingue par la pointe épineuse dentée et par le tissu plus serré. D'autre part, elle diffère de *S. Grainvillei* P. DE LA V., qui est moins robuste et possède une nervure scabre dans la partie supérieure.

## POTTIACEAE

## TRICHOSTOMUM HEDW.

**Trichostomum cylindricum** (BRUCH.) C. MÜLL., Syn., I, p. 586 (1849).

*Weisia cylindrica* BRUCH., Bryol. Germ., II, 1, p. 58 (1827).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : selle de Kabara, entre le Karisimbi et le Mikeno, alt. 3.000-3.100 m., clairière herbeuse dans l'étage des *Hagenia*, rochers, août 1937, n° 7356 A (fr.), en mélange avec *Braunia secunda* (HOOK.) BR. et SCHPR.

Espèce à dispersion étendue : Europe, Asie, Amérique du Nord et du Sud, Afrique du Sud, Madagascar et Ruwenzori; Congo Belge : région des volcans.

## TORTELLA (C. MÜLL.) LIMPR.

**Tortella Thérioti** BROTH. et P. DE LA V., Rev. Bryol., XLVII, 4, p. 49, fig. 2, p. 51 (1920).

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : Gahojo, alt. 1.500 m., cendrées volcaniques de 1904, en plaques dans les touffes de *Rumex maderensis*, août 1937, n° 6929 (fr.); Nzuru, alt. 1.500 m., champs de lave récents, à la base des parois d'un effondrement de 2<sup>m</sup>50 de profondeur, août 1937, n° 6988 (fr.); entre Mugunga et le Rumoka, alt. 1.500-1.600 m., forêt sclérophylle, au sol, sur cendrées, novembre 1937, n° 8622 (fr.).

Espèce d'Afrique Orientale Anglaise et de la région des volcans.

OBSERVATION. — Les feuilles ne sont pas aussi arrondies, à l'extrémité, que chez le type; la plupart sont progressivement acuminées et se rapprochent de la variété *angustata* DIX. et P. DE LA V. Toutefois, les cellules sont de la grandeur de celles du type.

## LEPTODONTIUM HAMP.

**Leptodontium tenerascens** BROTH. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch.-Zentr.-Afr. Exp. 1907-1908, II, p. 145, fig. 16, tab. XIII (1914).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : versant Nord du Karisimbi, alt. 3.850-4.400 m., alpage, en tapis, août 1937, n° 7397 B (st.), [mélange à *Bryum argenteum* L.].

Cette espèce n'a été recueillie, jusqu'à présent, qu'aux hautes altitudes dans la région des volcans et au Ruwenzori.

**Leptodontium squarrosum** (HOOK.) PAR., Ind. Bryol., p. 732 (1894).

*Didymodon squarrosus* HOOK., Musc. Exot., II, tab. 150 (1820).

*Leptodontium Macclennani* (DIX.) BROTH. in ENGL., Nat. Pflanzenf., éd. 2, X, p. 268 (1924).

*Holomitrium Macclennani* DIX., Smith. Misc. Coll., LXXII, 3, p. 2 (1920).

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : entre Kibumba et le Nyamuragira, alt. 1.800-2.000 m., épiphyte, août 1937, n° 7082 D, [en mélange avec *Hypnum cupressiforme* L. et *Syrrhopodon acrodontus* DEMAR. et LEROY]; entre Kibumba et le Nyamuragira, alt. 1.800-2.000 m., forêt sclérophylle dans la plaine de lave, en coussinets, août 1937, n° 7090 B (fr.), [en mélange avec *Macromitrium Bequaerti* THÉR. et NAV. et *Schlotheimia Bequaerti* THÉR. et NAV.]; entre Kingi et Nyefunze, plaine de lave entre le Nyamuragira et le Nyiragongo, alt. 1.850-2.050 m., forêt sclérophylle claire, épiphyte en plaques, octobre 1937, n° 7832 A (fr.), [en mélange avec *Hypnum cupressiforme* L.]; entre Mihanga et Kibumba, plaine de lave entre le Nyamuragira et le Nyiragongo, alt. 2.350 m., coulée de lave, octobre 1937, n° 7888 D (st.), [en mélange avec *Dicranum acanthoneurum* C. MÜLL.].

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE OCCIDENTAL : versant Est du Nyiragongo, alt. 2.600-2.700 m., étage frutescent sclérophylle, épiphyte en pelotes, novembre 1937, n° 8729 (st.); id., cratère du Shaheru, alt. 2.600 m., alpage, en tapis au sol, novembre 1937, n° 8794 A (st.), [en mélange avec *Hypnum cupressiforme* L. et *Brachythecium implicatum* (HORNSCH.) JAEG.]; id. alt. 2.700 m., alpage, en petites touffes, janvier 1938, n° 9328 (st.); id. alt. 2.700 m., alpage, janvier 1938, n° 9342 A (st.), [en mélange avec *Eurynchium africanum* HERZ. var. *latifolia* DEMAR. et LEROY].

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : versant sud du Mikeno, alt. 2.600 m., étage des Bambous, épiphyte en pelotes, aux verticilles des Bambous, août 1937, n° 7481 (fr.); id., alt. 2.600 m., étage des Bambous, épiphyte aux verticilles des Bambous, parmi les pelotes de mousses, août 1937, n° 7482 (fr.), [avec *Polypodium* sp.].

Signalé aux Indes orientales, à Madagascar et en Afrique du Sud; au Congo Belge : au Ruwenzori et région des volcans.

#### HYOPHILA BRID.

**Hyophila excurrentinervis** PAR. et BROTH., Rev. Bryol., XXXI, p. 43 (1904).

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, alt. 950 m., falaise, en tapis, août 1937, n° 7592 (st.).

Cette espèce, signalée précédemment en Afrique occidentale et dans l'Oubangui, est nouvelle pour le Congo Belge.

**DIDYMODON** HEDW.

**Didymodon rubellus** BR. et SCHPR var. **angustifolius** P. DE LA V., Bull. Soc. Bot. France, LXXXVII, p. 355 (1940).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : versant sud du Mikeno, alt. 2.800 m., petit marais de Rweru dans l'étage des *Hagenia*, talus herbeux, en tapis, août 1937, n° 7315 (st.) (forma *gracillima*).

Cette mousse a été recueillie pour la première fois au Congo, en 1929, par HUMBERT, sur le versant ouest du Ruwenzori.

**BARBULA** HEDW.

**Barbula indica** BRID., Bryol. Univ., I, p. 544 (1826).

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE ORIENTALE : Rutshuru, alt.  $\pm 1.250$  m., marais, sur rochers, en tapis, décembre 1937, n° 8999 (st.).

Déjà signalée en Asie méridionale et orientale, en Océanie, en Afrique tropicale orientale et méridionale; au Congo Belge : dorsale occidentale.

**Barbula kivuensis** LEROY et P. DE LA V., sp. nov.


(Fig. 12-16.)

Caespites sat compacti, atro-virides. Caulis 1-2,5 cm. altus, ramis fasciculatis et foliis inferioribus limbo superiore diruto instructus. Folia siccitate crispatula, interdum torquata, basin versus appressa, marginibus in parte superiore valde incurvis, madore erecto-patula, oblongo-acuta, canaliculata, marginibus passim paulo revolutis, integra, summo apice obsolete denticulata, 3 mm.  $\times$  0,80 mm.; costa ante apicem evanida, crassa, basi circiter 100  $\mu$ , apice 50  $\mu$  lata, dorso interdum scaberula. Cellulae in tertia inferiore parte sat lucidae, elongate rectangulares, circiter 40  $\mu \times$  10  $\mu$ , in reliqua parte opacae, minores, quadratae vel elongate hexagonae, 10-14  $\mu \times$  6-10  $\mu$ .

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE ORIENTALE : chutes de la Rutshuru, alt. 1.200 m., rochers dans les embruns, en tapis, janvier 1938, n° 9430 (st.) (typus) (fig. 12-16); Rutshuru, alt. 1.300 m., rochers, novembre 1937, n° 8433 C (st.), [en mélange avec *Philonotis microthamnia* (C. MÜLL.) BROTH. et *Funaria hygrometrica* (L.) SIBTH].

OBSERVATION. — Cette espèce, de la section *Hydrogonium* et voisine de *B. Ehrenbergii* (LOR.) FLEISCH. et de *B. afro-fontana* (C. MÜLL.) BROTH., se distingue par son aspect vert foncé, ses feuilles larges, assez raides, légèrement denticulées au sommet, son tissu très serré, notamment les cellules basilaires beaucoup plus courtes et moins claires que celles des autres espèces, par sa nervure parfois un peu scabre au sommet sur la face dorsale, finissant avant la pointe.

Il ne s'agit peut-être que d'une race locale, mais cette mousse, distincte de toutes les espèces africaines, nous paraît devoir mériter une dénomination spéciale.



*Barbula kivuensis* LEROY et P. DE LA V.

FIG. 12. — Plante ( $\times 2$ ). FIG. 13. — Feuille ( $\times 18,5$ ). FIG. 14. — Sommet d'une feuille ( $\times 195$ ).  
FIG. 15. — Cellules supérieures ( $\times 390$ ). FIG. 16. — Cellules basales ( $\times 390$ ).

(J.-M. Lerinckx del.)

**TORTULA** HEDW.

**Tortula muralis** (L.) HEDW. var. **obcordata** (SCHPR) LIMPR., Laubm. Deut. in Rab. Krypt.-Fl., IV, 11, p. 666 (1888).

*Barbula muralis* TIMM. var. *obcordata* SCHPR, Syn., 2<sup>e</sup> éd., p. 202 (1876).

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : lac Mugunga, alt.  $\pm 1.500$  m., berges rocheuses, novembre 1937, n° 8829 (fr.).

Cette variété est nouvelle pour le Congo Belge.

**Tortula erubescens** (C. MÜLL.) BROTH. in ENGL., Nat. Pflanzenf., I, 3, p. 434 (1902).

*Barbula erubescens* C. MÜLL., Nuov. Giorn. Bot. Ital., IV, p. 14 (1872).

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : lac Mugunga, alt.  $\pm 1.500$  m., berges rocheuses, novembre 1937, n° 8823 (st.).

Cette espèce, connue d'Afrique orientale, d'Érythrée et de l'Afrique du Sud, avait déjà été récoltée au Congo Belge dans la même région par BEQUAERT et signalée sous le nom de *Tortula meruensis* (C. MÜLL.) BROTH.

**Tortula Cavallii** NEGRI, Ann. di Bot., XII, p. 164 (1909).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : versant nord du Karisimbi, alt. 4.200 m., bosquet de *Senecio*, en touffes denses sur *Senecio*, août 1937, n° 7411 A (fr.), [en mélange avec *Leptodontiopsis fragilifolia* BROTH. var. *Brotheri* P. DE LA V.]; sommet du Karisimbi, alt. 4.507 m., blocs de lave, en pelotes lâches, août 1937, n° 7434 (st.).

Espèce d'Afrique tropicale orientale, du Ruwenzori et de la région des volcans.

OBSERVATION. — L'échantillon 7434 porte des feuilles à nervure généralement excurrente en un court mucron. Il est stérile et beaucoup moins luxuriant que le n° 7411 A fructifié. DIXON <sup>(1)</sup> avait aussi constaté que les plantes fructifiées étaient ordinairement plus robustes et que leurs feuilles présentaient souvent une pointe hyaline.

**Tortula torquatifolia** (GEH.) DIX., Det. Kongl. Norske Viden. Selsk. Skrifter, 4, p. 21 (1932).

*Barbula torquatifolia* GEH., Bull. Herb. Boiss., IV, p. 410 (1896).

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-Ya-Moto, savane, graviers, en tapis, septembre 1937, n° 7629 (st.).

Cette espèce est nouvelle pour le Congo Belge et l'Afrique centrale; elle était connue seulement de Rhodésie et d'Afrique Sud-Ouest.

<sup>(1)</sup> DIXON, H. N., The mosses collected by the Smithsonian African Expedition 1909-1910 [*Smith. Misc. Coll.*, LXIX, 2, p. 14 (1918)].



## GRIMMIACEAE

## RHACOMITRIUM BRID.

**Rhacomitrium alare** (BROTH.) PAR., Suppl. Ind. Bryol., p. 293 (1900).

*Grimmia alaris* BROTH., Engl. Bot. Jahrb., XXIV, p. 240 (1897).

*Rhacomitrium durum* (C. MÜLL.) PAR., Suppl. Ind. Bryol., p. 293 (1900).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE OCCIDENTAL : versant est du Nyiragongo, alt. 2.900-3.000 m., ravin humide dans l'étage frutescent sclérophylle, immergé dans une mare, novembre 1937, n° 8752 (st.) forma *mutica*.

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : sommet du Karisimbi, alt. 4.507 m., blocs de lave en coussinets épais, août 1937, n° 7429 A (st.), [en mélange avec *Polytrichum piliferum* SCHREB.].

Signalé au Cameroun, en Afrique tropicale orientale, au Ruwenzori et dans la région des volcans.

OBSERVATION. — L'échantillon n° 8752, qui était immergé dans une mare, ne s'est pas développé normalement. La tige principale, couchée, est devenue radiculeuse et les rameaux ont poussé en se redressant; les feuilles caulinaires n'offrent pas de poil à leur extrémité et sont toutes mutiques; les cellules alaires se sont mal développées et restent adhérentes à la tige. M. POTIER DE LA VARDE, de qui nous tenons ces observations, nous signale qu'il possède, de la même région, des formes de transition entre cette forme mutique et la forme apiculée habituelle.

## FUNARIACEAE

## FUNARIA SCHREB.

**Funaria hygrometrica** (L.) SIBTH. var. **calvescens** (SCHW.) BR. et SCHPR., Bryol. Eur., III, p. 9, tab. 305 (1841).

*Funaria calvescens* SCHW., Suppl. I, 2, p. 77 (1816).

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE ORIENTALE : Rutshuru, alt.  $\pm$  1.300 m., chutes de la Rutshuru, rochers, novembre 1937, n° 8433 B (fr.), [en mélange avec *Philonotis microthamnia* (C. MÜLL.) BROTH. et *Barbula kivuensis* LEROY et P. DE LA V.]; id., alt.  $\pm$  1.250 m., fossé près du marais de la Rutshuru, en tapis denses, décembre 1937, n° 9000 (fr.); id., alt. 1.270 m., vieux mur, près du sol, en tapis étendus, décembre 1937, n° 9003 (fr.); chutes de la Rutshuru, alt. 1.200 m., rochers dans les embruns, janvier 1938, n° 9429 (fr.); id., alt. 1.200 m., rochers dans les embruns, en petites pelotes, janvier 1938, n° 9437 (fr.).

Cette variété est répandue dans toutes les régions tropicales du globe.

OBSERVATION. — Les spécimens portant les n<sup>os</sup> 9000, 9003, 9429 et 9437 correspondent bien à la description de *Fumaria calvescens* SCHW. que nous semmes tentés de considérer comme une simple forme de *F. hygrometrica* (L.) SIBTH.

Le n<sup>o</sup> 8433 B se rapproche quelque peu de ce dernier.

## BRYACEAE

### STABLERIA LINDB.

**Stableria tenella** (MITT.) BROTH. in ENGL., Nat. Pflanzenf., I, 3, p. 543 (1909).

*Orthodontium tenellum* MITT., Journ. Linn. Soc., Musc. Austr. Am., XII, p. 275 (1869).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE OCCIDENTAL : versant est du Nyiragongo, alt. 2.900 m., étage frutescent sclérophylle, épiphyte en tapis, novembre 1937, n<sup>o</sup> 8737 (fr.); id., cratère du Shaheru, alt. 2.700 m., bosquet d'*Hypericum*, janvier 1938, n<sup>o</sup> 9356 (fr.).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : versant nord du Karisimbi, entre Kabara et Rukumi, alt. 3.200 m., étage des *Hagenia*, épiphyte en plaques sur *Hagenia*, août 1937, n<sup>o</sup> 7393 (fr.); id., alt. 3.900 m., bosquet de bruyères, épiphyte sur bruyère, en plaque, août 1937, n<sup>o</sup> 7402 (fr.).

C'est une espèce nouvelle pour le Congo Belge.

OBSERVATION. — La mousse du Chili (Vina del Mar, Salto, BERTHO, 1923), que M. THÉRIOT nous a complaisamment communiquée, diffère de nos échantillons par ses capsules plus brusquement contractées en un col plus ou moins long et ses feuilles moins robustes et moins onduleuses. Toutefois, s'il n'y a pas identité absolue entre elles, il s'agit de l'avis même de THÉRIOT, de différences légères et peu constantes. Le n<sup>o</sup> 9356 est moins robuste et se rapproche fortement du type.

### MIELICHHOFERIA HORNSCH.

**Mielichhoferia ruwenzorensis** THÉR. et NAV. in NAV., Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., LX, p. 36, fig. 16 (1927).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : sommet du Karisimbi, alt. 4.507 m., blocs de lave, août 1937, n<sup>o</sup> 7430 A (fr.), [en mélange avec *Andreaea kilimandjarica* PAR.]; id., alt. 4.507 m., blocs de lave, août 1937, n<sup>o</sup> 7433 A (fr.), [en mélange avec *Andreaea kilimandjarica* PAR.].

Cette mousse n'était signalée, jusqu'à présent, qu'au Ruwenzori.

**WEBERA** HEDW.

**Webera elongata** (HEDW.) SCHW. in L., Sp. Pl., éd. 4, V, p. 48 (1830).

*Pohlia elongata* HEDW., Descr., I, p. 96 (1787).

Sous-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE : entre Lubero et Butembo, alt. 1.800 m., talus argileux dans la forêt, en tapis, février 1938, n° 9887 (fr.).


Espèce à vaste dispersion : Europe, Asie centrale et orientale, Amérique septentrionale et orientale, Algérie, Kilimandjaro, Madagascar, Kerguelen et au Congo Belge : région des volcans.

**MNIOBRYUM** (SCHPR ex p.) LIMPR.

**Mniobryum pergracile** THÉR. et P. DE LA V. in P. DE LA V., Rev. Bryol., XI, p. 174, fig. 1, 4 (1938) emend. DEMAR. et LEROY.

(Fig. 17-18.)

Seta fusco-rubra, laevis, 12-15 mm. alta. Theca horizontalis vel nutans, oblongo-ovalis, subcylindrica, fusca, 2,5-3 mm. × 0,8-1 mm., collo tertiam



*Mniobryum pergracile* THÉR. et P. DE LA V.

FIG. 17. — Capsule (×13).

FIG. 18. — Péristome (×265).

(J.-M. Lérinckx del.)

partem sporangii aequante, stomatibus immersis; exostomii dentes lanceolati, trabeculati, circa  $100 \mu \times 20-22 \mu$ , fusco-flavescentes, ad  $3/4$  inferiores minute granulati, apicem versus pallide flavescentes ac papilloso; endosto-

mium 90-100  $\mu$  altum, inferiore parte, e membrana pallida, dimidiam partem altitudinis attingente compositum atque processibus carinatis, perforatis, apice interdum fissis; cilia 2-3, coalita, inaequalia, parum nodulosa, interdum appendiculata. Spori 14-20  $\mu$ .

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : selle de Kabara, entre le Karisimbi et le Mikeno, alt. 3.000-3.100 m., clairière herbeuse dans l'étage des *Hagenia*, rochers, en petites plaques, août 1937, n° 7360 (fr.).


Cette espèce de l'Oubangui est nouvelle pour le Congo Belge.

### BRACHYMENIUM SCHWAEGR.


**Brachymenium philonotula** (HAMP.) BROTH., Engl. Bot. Jahrb., XX, p. 191 (1895). (Fig. 19-20.)

*Bryum philonotula* HAMP., Hild. M. Madag., n° 2136 (sec. Paris).

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLLES : cône de déjections du Rumoka, alt  $\pm$  1.600 m., cailloutis salins au voisinage des fumerolles, en tapis, août 1937, n°s 7025 (st.) et 7026 (fr.) (fig. 19-20).



19



20

*Brachymenium philonotula* (HAMP.) BROTH.

FIG. 19. — Feuille ( $\times 30$ ). FIG. 20. — Cellules moyennes ( $\times 425$ ).

(Demaret et Leroy del.)

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : petite mare de Kikeri au pied du Mikeno, alt. 2.200 m., falaise de cendrées, en tapis, août 1937, n° 7224 (fr.).

Cette espèce, signalée depuis longtemps à Madagascar, est nouvelle pour le Congo Belge. Elle a été trouvée plus récemment dans l'Usambara et à Madère.


**Brachymerium pachyloma** (R. et C.) THÉR. in P. DE LA V., Bull. Mus. Nat. Hist. Natur., Paris, XIV, 5, p. 365 (1942).

(Fig. 21-22.)

*Brachymerium subflexifolium* R. et C. var. *pachyloma* R. et C., Suppl. Prod. Fl. Bryol. Madag., p. 54 (1909).

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : versant est du Nyiragongo, alt.  $\pm 2.000$  m., forêt sclérophylle à tendance mésophile, novembre 1937, n° 8698 (fr.).

Cette espèce vient d'être signalée pour la première fois au Congo Belge et dans la même région par POTIER DE LA VARDE <sup>(1)</sup>.



21

22

*Brachymerium pachyloma* (R. et C.) THÉR.

FIG. 21. — Feuille ( $\times 30$ ).

FIG. 22. — Cellules moyennes ( $\times 425$ ).

(Demaret et Leroy del.)

**Brachymerium rosulatum** P. DE LA V., Rev. Bryol., Nouv. Sér., IX, p. 204, fig. 6, p. 205 (1936).

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : entre Mugunga et le Rumoka, alt. 1.500-1.600 m., forêt sclérophylle, épiphyte, novembre 1937, n° 8578 (fr.), [en mélange avec *Sematophyllum caespitosum* (Sw.) MITT.].

Espèce nouvelle pour le Congo Belge, signalée précédemment dans l'Oubangui.

OBSERVATION. — La mousse de Lebrun diffère de l'échantillon original que M. POTIER DE LA VARDE nous a complaisamment offert, par les feuilles plus lâches et par une moins forte pustulosité du col de la capsule.

<sup>(1)</sup> POTIER DE LA VARDE, R., Récoltes bryologiques de M. H. Humbert en Afrique Equatoriale [Bull. Mus. Nat. Hist. Natur., Paris, XIV, 5, p. 365 (1942)].

**Brachymenium ruwenzorens** THÉR. et NAV. in NAV., Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., LX, p. 38, fig. 18 (1927).


SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : entre Mugunga et le Rumoka, alt. 1.500-1.600 m., forêt sclérophylle, épiphyte sur l'écorce d'un *Ficus*, en plaques, novembre 1937, n° 8609 (fr.).

Signalé précédemment au Ruwenzori.


**Brachymenium elgonense** DIX., Brot., VII, p. 184 (1938).

(Fig. 23-24.)

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : entre Rusayo et Kibati, alt. 1.800-1.900 m., forêt sclérophylle claire, épiphyte en tapis continu, novembre 1937, n° 8677 (fr.) (fig. 23-24).



23



24

*Brachymenium elgonense* DIX.

FIG. 23 — Feuille ( $\times 30$ ).

FIG. 24. — Cellules moyennes ( $\times 425$ ).

(Demaret et Leroy del.)

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : versant sud du Mikeno, alt. 2.600 m., étage des Bambous, en pelote aux verticilles des Bambous, août 1937, n° 7486 (fr.).

Cette espèce, recueillie pour la première fois par DUMMER au mont Elgon (Uganda) en 1918, n'avait plus été signalée en Afrique depuis lors; elle est nouvelle pour la flore du Congo Belge.

#### ANOMOBRYUM SCHPR

**Anomobryum filiforme** (DICKS.) HUSN., Musc. Gall., p. 222, tab. 60 (1888).

*Bryum filiforme* DICKS., Fl. Crypt., IV, p. 16 (1801).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : versant sud du Mikeno, alt. 2.800 m., petit marais de Rweru dans l'étage des *Hagenia*, en touffes sur blocs de pierre, août 1937, n° 7328 (st.).

Espèce largement répandue : Europe, Amérique centrale et méridionale, Algérie, Abyssinie, Cameroun, Madagascar; Congo Belge et Ruanda : région des volcans, forêt de Rugege.

#### PLAGIOBRYUM LINDB.

**Plagiobryum laxum** DEMAR. et P. DE LA V. sp. nov.

(Fig. 25-28.)

Caespituli pallide virides, rubescentes, paulum compacti. Caulis minimus, ruber, circa 9 mm. altus, radiculosus, innovationibus plerumque simplicibus; folia erecto-patula, apicem caulis versus laxiuscule imbricata, concava, late ovalia, apice obtusa, interdum quasi truncata, marginibus in dimidio superiore saepe incurvatis, 1mm.  $\times$  0.60-0.85 mm.; costa praecipue apud folia inferiora rubescens, in mucronem brevem, acutum, excurrens, ad insertionem 50  $\mu$  lata; cellulae laxae, parietibus tenuibus, infima basi subrectangulares, 40-50  $\mu$   $\times$  20-22  $\mu$ , mediae longe hexagonae, 60-90  $\mu$   $\times$  20-30  $\mu$ , superiores magis ac magis breviores.

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : grand marais de Kikeri, alt. 2.200 m., falaise de cendrées au bord du marais, novembre 1937, n° 8534 (st.).


OBSERVATION. — Cette espèce du même groupe que *P. Zierii* (DICKS.) LINDB., se distingue facilement de ce dernier par sa foliation lâche, ses larges feuilles obtuses au sommet et par sa nervure nettement excurrente.

#### LEPTOBRYUM (BR. et SCHPR) WILS.

**Leptobryum piriforme** (L.) WILS., Bryol. Brit., éd. 3, p. 219 (1855).

*Mnium piriforme* L., Sp. Pl., p. 1112 (1753).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : Kikeri, au pied du Mikeno, petite mare, alt. 2.200 m., falaise de cendrées, août 1937, n° 7226



*Plagiobryum laxum* DEMAR. et P. DE LA V.

FIG. 25. — Tige ( $\times 10$ ). FIG. 26. — Feuille ( $\times 37,5$ ). FIG. 27. — Cellules basales ( $\times 390$ ).  
FIG. 28. — Cellules supérieures ( $\times 390$ ).

(J.-M. Lerinckx del.)

(fr.) et 7227 (fr.); id., alt. 2.100 m., falaise de cendrées, en tapis dense, janvier 1938, n° 9304 (fr.).

Cette espèce, répandue dans tous les continents, est nouvelle pour le Congo Belge; elle n'avait été signalée jusqu'à présent que dans l'Afrique du Sud et à Madagascar.



**BRYUM** DILL.**Bryum fusco-tomentosum** DEMAR. et LEROY sp. nov.

(Fig. 29-32.)

Caespites laxi, valde fusco-tomentosi. Caulis 1-1,5 cm. altus, ruber. Folia sicca undulata, interdum tortuosa, difficile emollienda, humida erecto-patentia, superiora spathulata, acuta, 3-3,5 mm. longa, 0,8-1,2 mm. lata, integra vel paululum sinuolata, acumine saepe reflexiusculo, inferiora paululum longiora et oblongiora; costa sub apice evanescens, interdum percurrentis, fusca, aetate rubra, medio folii 80-90  $\mu$ ; cellulae mediae 40  $\times$  20  $\mu$ , hexagonae, basilares plus minusve rectangulares, 80  $\times$  20  $\mu$ , marginales angustiores, sublineares, longiores. Caetera desunt.

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : Nzuru, alt. 1.470 m., champs de lave récents, grande caverne humide et ombragée tapissée de mousses, sur la terre humide dans le fond de la grotte, août 1937, n° 6999 A (st.), [en mélange avec *Thuidium intricatum* (MITT.) JAEG.].

OBSERVATION. — Cette espèce semble appartenir à la section *Calophylloidea* KINDB., mais ceci devra être confirmé par la découverte des capsules. Elle n'est pas très éloignée de *Bryum Tisserantii* P. DE LA V. et de sa var. *sublimbatum* P. DE LA V., mais s'en distingue aisément par les feuilles plus étroites et spatulées et le tissu plus clair.


**Bryum argenteum** L. var. **lanatum** BR. et SCHPR, Bryol. Eur., IV, Mon., p. 79 (1839).

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : entre Rusayo et Kibati, alt. 1.800-1.900 m., forêt sclérophylle très claire, blocs de lave, en pelotes, novembre 1937, n° 8686 (fr.); lac Mugunga, alt.  $\pm$ 1.500 m. rochers ensoleillés, en petites pelotes, novembre 1937, n° 8831 (st.).


SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : versant nord du Karisimbi, alt. 3.850-4.400 m., alpage, août 1937, n° 7397 A (fr.), [mêlé à quelques brins de *Leptodontium tenerascens* BROTH.]; id., plateau de Rukumi, alt. 3.700 m., bosquet de *Philippia*, blocs de lave, en tapis, août 1937, n° 7461 (fr.).

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi, alt.  $\pm$ 1.000 m., savane, en plaques sur le sol, octobre 1937, n° 7926 (st.).


Mousse cosmopolite.




29



30



31



32

*Bryum fusco-tomentosum* DEMAR. et LEROY.

FIG. 29. — Feuille ( $\times 30$ ).

FIG. 30. — Sommet d'une feuille ( $\times 425$ ).

FIG. 31. — Cellules basales ( $\times 425$ ).

FIG. 32. — Cellules moyennes ( $\times 425$ ).

(Demaret et Leroy del.)

**Bryum argenteum** L. var. **argyrotichum** (C. MÜLL.) MITT., Journ. Linn. Soc., p. 307 (1886).

*B. argyrotichum* C. MÜLL., Linn., p. 385 (1875).

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, alt.  $\pm 1.000$  m., bosquets xérophiles, sur la terre fraîche, décembre 1937, n° 9228.

Signalé précédemment en Afrique tropicale orientale et en Afrique centrale.

**Bryum arecblastum** C. MÜLL., Flora, p. 280 (1886).


SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE ORIENTALE : Rutshuru, alt.  $\pm 1.250$  m., bords du marais de la Rutshuru, en tapis sur bois mort, décembre 1937, n° 9001 (st.).

Espèce déjà recueillie à Saint-Thomé, Fernando Po, au Cameroun, au Gabon, au Kenia, dans l'Usambara et au Congo Belge : Ruwenzori.

**Bryum spiralifolium** DIX., Journ. of Bot., p. 258, pl. 614, fig. 13 (1938).

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : entre Kingi et Busogo, alt. 1.700-1.800 m., clairière herbeuse dans la forêt sclérophylle, point d'eau dans la lave, novembre 1937, n° 8645 (st.).

Cette espèce, signalée jusqu'à présent au Kenya, est nouvelle pour le Congo Belge.



33

*Bryum Preussii* BROTH.

FIG. 33. — Coupe transversale de la nervure ( $\times 425$ ).

(Demaret et Leroy del.)

**Bryum Preussii** BROTH., Engl. Bot. Jahrb., XX, p. 187 (1895).

(Fig. 33.)

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE OCCIDENTAL : versant est du Nyiragongo, cratère du Shaheru, alt. 2.100 m., alpage, sur le sol, en pelotes, novembre 1937, n° 8793 (st.).

Espèce connue du Cameroun, du Ruwenzori et de la région des volcans.

OBSERVATION. — Cette espèce a été parfois classée dans le genre *Rhodobryum*. Les coupes de la nervure que nous avons faites révèlent la présence de stéréides sur la face dorsale seulement, et l'absence de sténocystes; il s'agit donc bien d'un *Bryum*.


### RHODOBRYUM (SCHPR) HAMP.

**Rhodobryum spathulosifolium** (C. MÜLL.) PAR., Ind. Bryol., p. 1121 (1894), emend. DEMAR. et LEROY.

(Fig. 34.)

*Bryum spathulosifolium* C. MÜLL., Flora, p. 474 (1890).

Seta recta, 2,5-3,5 cm. alta, fusco-rubra, nitida; theca cylindrica subhorizontalis, paulum asymmetrica, arcuatula, collo 1/3 sporangii subaequante; peristomium normale; operculum conicum.



34

*Rhodobryum spathulosifolium* (C. MÜLL.) PAR.

FIG. 34. — Coupe transversale de la nervure ( $\times 195$ ).

(J.-M. Lerinckx del.)

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : entre Kibumba et le Nyamuragira, alt. 1.800-2.000 m., forêt sclérophylle dans la plaine de lave, épiphyte en tapis sur les branches, août 1937, n° 7091 (fr.); entre Kingi et Nyefunze, plaine de lave entre le Nyamuragira et le Nyiragongo, alt. 1.850-2.050 m., forêt sclérophylle claire, en plaques sur blocs de lave, octobre 1937, n° 7833 (fr.); Kikomero, alt. 1.850 m., plaine de lave, crevasse humide et ombreuse, sur le sol, novembre 1937, n° 8486 (st.).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE OCCIDENTAL : versant est du Nyiragongo, alt. 2.200-2.400 m., forêt de montagne, novembre 1937, n° 8708 (fr.).

Cette espèce a été signalée pour la première fois au Congo Belge par HAUMAN en 1932 (vallée de la Butahu, alt. 2.600 m.) <sup>(1)</sup>. Elle est connue du Kenya, du Kilimandjaro et de l'Usambara.

<sup>(1)</sup> HAUMAN, L., Les Bryophytes des hautes altitudes au Ruwenzori [*Bull. Jard. Bot. Etat Brux.*, XVI, p. 336 (1942)].

OBSERVATION. — Les groupes de sténocystes caractérisant le genre *Rhodbryum* apparaissent nettement dans des coupes de feuilles faites à la base et au sommet de la nervure (fig. 34).

## BARTRAMIACEAE

### PHILONOTIS BRID.

**Philonotis nanothecia** (C. MÜLL.) PAR., Ind. Bryol., p. 926 (1894).

*Bartramia nanothecia* C. MÜLL., Flora, p. 277 (1886).

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLLES : entre Kingi et Busogo, alt. 1.700-1.800 m., clairière herbeuse dans la forêt sclérophylle, point d'eau, en tapis, novembre 1937, n° 8646 (st.).

Cette espèce était connue de Saint-Thomé, de l'Oubangui et de la vallée de la Semliki.

**Philonotis microthamnia** BROTH., Engl. Bot. Jahrb., XXIV, p. 251 (1897).

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE ORIENTALE : Rutshuru, alt.  $\pm$  1.300 m., chutes de la Rutshuru, rochers, nov. 1937, n° 8433 A (st.), [en mélange avec *Funaria hygrometrica* (L.) SIBTH. et *Barbula kivuensis* LEROY et P. DE LA V.]; id., alt. 1.200 m., sur rochers dans les embruns, en petites pelotes, janvier 1938, n° 9428 (st.).

OBSERVATION. — Cette espèce, nouvelle pour le Congo Belge, a été trouvée en 1934 par TAYLOR au Ruwenzori, sur le versant Ugandien. On la connaît du Gabon, de l'Oubangui et du Cameroun.

**Philonotis imbricatula** MITT., f. *laxa*, Journ. Proc. Linn. Soc., p. 61 (1859).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE OCCIDENTAL : versant est du Nyiragongo, alt. 2.900-3.000 m., ravin humide dans l'étage frutescent sclérophylle, en gros tapis, novembre 1937, n° 8748 (fr.).

Espèce d'Asie méridionale, de Madagascar, d'Afrique tropicale et australe qui avait déjà été signalée dans notre Colonie aux environs de Stanleyville et dans la région du Ruwenzori.


### BREUTELIA SCHPR

**Breutelia Lebrunii** DEMAR. et LEROY sp. nov.

(Fig. 35-38.)

Caespites compacti, flavo-virides, sat nitentes. Caulis ruber, 1-2 cm. longus, parce ramosus, inferne tomentosus. Folia erecto-patentia vel patentia, 3 mm. longa, 0,40-0,50 mm. lata, ovata, sensim longissima et tenuiter

acuminata, haud vel paululum plicata, marginibus ad  $\frac{2}{3}$  inferiores anguste revolutis, in parte inferiore parietibus transversalibus cellularum prominentibus molle sinuolatis, in parte superiore serrulatis; costa in subulam elongatum flexuosam percurrans. Cellulae mediae lineares, apice papilla



*Breutelia Lebrunii* DEMAR. et LEROY.

FIG. 35. — Feuille ( $\times 20$ ).      FIG. 36. — Pointes de feuilles ( $\times 390$ ).

FIG. 37. — Cellules basales ( $\times 390$ ).

FIG. 38. — Cellules moyennes ( $\times 390$ ).

(J.-M. Lerinx del.)

praeditae,  $30-50 \mu \times 6-7 \mu$ , basiales breviores,  $10-12 \mu$  latae, sublaeves, infimae fuscae, marginales infimae quadratae nonnullae. Caetera desunt.

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : entre Busogo et Rusayo, alt. 1.800 m., paroi verticale d'une crevasse de lave, en grosses pelotes. novembre 1937, n° 8669 (st.).

OBSERVATION. — Par son aspect brillant, ses feuilles non apprimées, à base non engainante, cette espèce nous paraît devoir être rattachée à la section *Acoleos* (C. MÜLL.) BROTH.

***Breutelia subgnaphalea*** (C. MÜLL.) PAR., Ind. Bryol., p. 154 (1894).

*Bartramia subgnaphalea* C. MÜLL., Flora, p. 480 (1890).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : versant nord du Kari-simbi, plateau de Rukumi, alt. 3.700 m., alpage à *Carex*, formant tapis sur le sol entre les touffes de *Carex*, août 1937, n° 7458 (st.).

Signalé en Afrique tropicale orientale et méridionale, à Madagascar; au Congo Belge : au Ruwenzori, dans la région des volcans; au Ruanda : dans la forêt de Rugege.

***Breutelia subgnaphalea*** (C. MÜLL.) PAR. var. ***densiramea*** NEGRI, Il Ruwenzori, p. 503 (1909).

(Fig. 39-40.)

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : versant nord du Kari-simbi, alt. 4.200 m., alpage, en tapis parmi les Alchemilles, août 1937, n° 7408 (fr.).



39

*Breutelia subgnaphalea* (C. MÜLL.) PAR. var. *densiramea* NEGRI.

FIG. 39. — Plante fructifiée (1/1). FIG. 40. — Extrémités de rameaux (x2).

(J.-M. Lerinckx del.)

OBSERVATION. — D'après DIXON, *Breutelia diffracta* MITT. est extrêmement voisin de *B. subgnaphalea*; il s'en distingue par le pédicelle droit et flexueux, d'environ 1 cm. de hauteur. Les pédicelles des quatre fructifications trou-

vées sur nos échantillons sont très recourbés et mesurent de 5 à 9 mm. La description de *B. diffracta* MITT. signale que la capsule est gymnostome. L'examen des fructifications de notre n° 7408 a révélé la présence d'un péristome, malheureusement trop abimé pour être décrit. Les deux espèces semblent donc bien distinctes.

Cette variété était jusqu'à présent signalée au Kenya et sur le versant oriental du Ruwenzori. Elle est donc nouvelle pour le Congo Belge.

## ORTHOTRICHACEAE

### ZYGODON HOOK. et TAYL.

**Zygodon dioicus** BROTH., Engl. Bot. Jahrb., XXX, p. 262 (1901).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : entre Kabara et le Rukumi, versant nord du Karisimbi, alt. 3.100-3.300 m., étage des *Hagenia*, épiphyte sur *Hagenia*, août 1937, n° 7384 A (fr.), [en mélange avec *Campylopus stramineus* (MITT.) JAEG.].

Cette espèce, connue seulement de l'Afrique tropicale orientale, est nouvelle pour le Congo Belge.

**Zygodon semitortus** MITT., Journ. Linn. Soc., VII, p. 152 (1864).

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : Mushumangabo, alt. 2.200 m., forêt à tendance mésophile, épiphyte, août 1937, n° 7159 A.

Cette espèce du Cameroun est nouvelle pour notre Colonie.

**Zygodon seriatus** THÉR. et NAV. in MALTA, Latv. Univ. Bot. Darz. Darb., I, p. 173, fig. p. 66 (1926).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : entre Kabara et le Rukumi, versant nord du Karisimbi, alt. 3.200 m., étage des *Hagenia*, épiphyte sur *Hagenia*, en pelotes, août 1937, n° 7386 B (st.), [avec *Zygodon Roccatii* NEGRI]; versant nord du Karisimbi, plateau de Rukumi, alt. 3.700 m., bosquet de *Philippia*, épiphyte sur *Senecio*, en pelotes, août 1937, n° 7463 C (st.), [mêlé à *Hypnum cupressiforme* L., *H. cupressiforme* L. var. *resupinatum* (WILS.) SCHPR et *Campylopus denticuspes* BROTH.].

Signalé en Afrique tropicale orientale, au Ruwenzori et dans la région des volcans.

**Zygodon intermedius** BR. et SCHPR, Bryol. Eur., III, Mon., p. 9 (1838).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : versant nord du Karisimbi, alt. 3.900 m., bosquet de *Senecio*, épiphyte sur *Senecio*, août 1937, n° 7400 D (fr.), [en mélange avec *Orthotrichum affine* SCHRAD., *Daltonia*



*Mildbraedii* BROTH. var. *laevis* DEMAR. et LEROY et *Campylopus stramineus* (MITT.) JAEG.]; versant nord du Karisimbi, alt. 3.950 m., bosquet de *Senecio*, épiphyte sur *Senecio*, en pelote à la face inférieure des branches, août 1937, n° 7403 A (fr.), [en mélange avec *Leptodontiopsis fragilifolia* BROTH. var. *Brotheri* P. DE LA V.].

Espèce largement répandue : Asie centrale et méridionale, Australie, Amérique du Sud, Afrique tropicale et méridionale; au Congo et au Ruanda, on la connaissait de la région de Rugege et des volcans.

**Zygodon Roccatii** NEGRI, Ann. di Bot., VII, p. 165 (1908).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : entre Kabara et le Rukumi, versant nord du Karisimbi, alt. 3.200 m., étage des *Hagenia*, épiphyte sur *Hagenia*, en pelotes, août 1937, n° 7386 A (fr.), [avec *Zygodon seriatus* THÉR. et NAV.].

Espèce du Ruwenzori et de la région des volcans.

**Zygodon microtheca** DIX. in MALTA, Act. Univ. Latv., X, p. 315, fig. p. 316 (1924).

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : entre Mugunga et le Rumoka, alt. 1.500-1.600 m., forêt sclérophylle, épiphyte, novembre 1937, n° 8595 B (fr.), [en mélange avec *Erythrodontium subjulaceum* (C. MÜLL.) PAR. et *Haplocladium angustifolium* (HAMP. et C. MÜLL.) BROTH. var. *afro-capillatum* (BROTH.) THÉR.].

Déjà connu du Ruwenzori et du Kenya.

OBSERVATION. — Les pédicelles atteignent 3-4 mm., alors que dans le type ils mesurent environ 2 mm.

#### LEPTODONTIOPSIS BROTH.

**Leptodontiopsis fragilifolia** BROTH. var. **Brotheri** P. DE LA V., Bull. Mus. Nat. Hist. Natur., Paris, XIV, 5, p. 368 (1942).

*Zygodon fragilifolius* BROTH. in Malta, Latv. Univ. Bot. Darz. Darb., I, p. 173, fig. p. 65 (1926).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : versant nord du Karisimbi, alt. 3.950 m., bosquet de *Senecio*, épiphyte sur *Senecio*, en pelotes à la face inférieure des branches, août 1937, n° 7403 B (st.), [en mélange avec *Zygodon intermedius* BR. et SCHPR]; id., alt. 4.200 m., bosquet de *Senecio*, en touffes denses sur *Senecio*, août 1937, n° 7411 B (st.) [en mélange avec *Tortula Cavalliï* NEGRI].

Signalé au Kilimandjaro, au Ruwenzori et dans la région des volcans.

**ORTHOTRICHUM** HEDW.

**Orthotrichum affine** SCHRAD., Spicil. Fl. Germ., p. 67 (1794).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : versant nord du Kari-simbi, alt. 3.900 m., bosquet de *Senecio*, épiphyte sur *Senecio*, août 1937, n° 7400 B (fr.), [en mélange avec *Campylopus stramineus* (MITT.) JAEG. et *Daltonia Mildbraedii* BROTH var. *laevis* DEMAR. et LEROY].

Cette espèce est nouvelle pour le Congo Belge et l'Afrique centrale; elle est signalée en Europe, en Asie, dans l'Amérique du Nord et dans l'Afrique du Nord.

**MACROMITRIUM** BRID.

**Macromitrium hyalinum** BROTH., Engl. Bot. Jahrb., XX, p. 185 (1894).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : versant sud du Mikeno, alt. 2.600 m., étage des Bambous, épiphyte aux verticilles des Bambous, août 1937, n° 7487 (fr.).

Espèce d'Afrique tropicale orientale et du Ruwenzori.

**Macromitrium Mannii** JAEG., Ber. Thät. St-Gall Nat. Gesells. (Ad. Fl. Musc.), p. 147 (1874).

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : Kikomero, alt. 1.850 m., plaine de lave, au fond d'une crevasse humide et ombreuse, novembre 1937, n° 8491 B (fr.), [en mélange avec *Hypopterygium laricinum* (HOOK.) BRID., *Campylopus introflexus* (HEDW.) MITT., *Thuidium intricatum* (MITT.) JAEG., *Thuidium pycnangiellum* C. MÜLL., *Rhacopilum Buttneri* BROTH.].

Cette espèce avait été signalée une fois au Congo Belge <sup>(1)</sup>, comme *M. undatifolium* C. MÜLL. que SIM et DIXON considèrent comme un synonyme de *M. Mannii* JAEG. Elle n'est connue jusqu'à présent qu'en Afrique : Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Saint-Thomé, Fernando-Po, Gabon, Cameroun, Madagascar.

**Macromitrium Bequaerti** THÉR. et NAV. in NAV., Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., LX, p. 50, fig. 27 (1927), emend. DEMAR. et LEROY.

(Fig. 41.)

Operculum conicum longe subulatum,  $\frac{1}{2}$  thecae longitudinis attingens. Peristomium duplex; exostomium dentibus papillosis irregulariter formatis et basi in membranam fusco-flavescentem conjunctis; endostomium  $\frac{3}{4}$

(1) NAVEAU, R., Musci Bequaerti, I [Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., LX, p. 52 (1928)].

exostomii altitudinis attingens, e membrana irregulariter laciniata, leucophaea, papillosissima formatum.

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLLES : entre Kibumba et le Nyamuragira, alt. 1.800-2.000 m., plaine de lave, août 1937, n° 7038 (fr.) (fig. 41); entre Kibumba et le Nyamuragira, alt. 1.800-2.000 m., forêt sclérophylle dans la plaine de lave, épiphyte en cou-



41

*Macromitrium Bequaerti* THÉR. et NAV.

FIG. 41. — Capsule (×17).

(J.-M. Lericq del.)

sinets, août 1937, n° 7090 A (fr.), [en mélange avec *Leptodontium squarrosium* (HOOK.) PAR. et *Schlotheimia Bequaerti* THÉR. et NAV.]; Mushuman-gabo, versant est du Nyamuragira, alt. 2.100 m., forêt, en coussinets, août 1937, n° 7150 (fr.); Kikomero, alt. 1.850 m., plaine de lave, tapis épais sur blocs de lave, surtout sur les parois, novembre 1937 n° 8492 C (fr.), [en mélange avec *Campylopus introflexus* (HEDW.) MITT. et *Schlotheimia Bequaerti* THÉR. et NAV.].

Espèce connue seulement de l'Est de notre Colonie.

#### SCHLOTHEIMIA BRID.

***Schlotheimia rigescens*** BROTH., Engl. Bot. Jahrb., XX, p. 186 (1894).

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLLES : entre Mugunga et le Rumoka, alt. 1.500-1.600 m., forêt sclérophylle, épiphyte en petites plaques, novembre 1937, n° 8590 (fr.).

OBSERVATION. — Cette espèce, qui était connue de l'Afrique orientale, vient d'être signalée dans la plaine de lave par POTIER DE LA VARDE, parmi les récoltes du Prof<sup>r</sup> HUMBERT. Il s'agit d'une forme à coiffe moins scabre au sommet que celle du type; notre n° 8590 présente la même particularité.

***Schlotheimia Bequaerti*** THÉR. et NAV. in NAV., Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., LX, p. 52 (1927).

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLLES : entre Kibumba et le Nyamuragira, alt. 1.800-2.000 m., forêt sclérophylle dans la plaine de lave, en plaque sur bloc de lave désagrégé. août 1937, n° 7074 A (fr.), [en mélange avec *Gollania Demareti* P. DE LA V.]; entre

Kibumba et le Nyamuragira, alt. 1.800-2.000 m., forêt sclérophylle dans la plaine de lave, en coussinets, août 1937, n° 7090 C (fr.), [en mélange avec *Macromitrium Bequaerti* THÉR. et NAV. et *Leptodontium squarrosus* (HOOK.) PAR.]; entre Kibumba et le Nyamuragira, alt. 1.800-2.000 m., forêt sclérophylle dans la plaine de lave, en coussinets, août 1937, n° 7094 (fr.); Kikomero, alt. 1.850 m., plaine de lave, en tapis épais sur blocs de lave, surtout sur les parois, novembre 1937, n° 8492 B (fr.), [en mélange avec *Campylopus introflexus* (HEDW.) MITT. et *Macromitrium Bequaerti* THÉR. et NAV.].

Signalé auparavant entre Walikale et Lubutu et au massif du Kahuzi.

OBSERVATION. — Les n°s 7074 A, 7090 C et 7094 sont des formes un peu plus robustes que le type; elles portent des capsules et des coiffes un peu plus longues (respectivement 2 et 3 mm.).

**Schlotheimia brachypodia** THÉR. et NAV. in NAV., Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., LX, p. 53, fig. 30, p. 54 (1927).

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : entre Mugunga et le Rumoka, alt. 1.500-1.600 m., forêt sclérophylle, épiphyte sur l'écorce d'un *Ficus*, novembre 1937, n° 8614 (st.).

A été récolté par BEQUAERT dans la forêt (Penghe aux bords de l'Ituri) et dans la plaine de lave à l'Ouest de Rutshuru (Angi).

## RHACOPILACEAE

### RHACOPILUM PALIS.

**Rhacopilum Buttneri** BROTH., Engl. Bot. Jahrb., XX, p. 215 (1894).

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : Kikomero, alt. 1.850 m., plaine de lave, en plaques au fond d'une crevasse humide et ombreuse, novembre 1937, n° 8491 B (st.), [en mélange avec *Hypnum cupressiforme* L., *Thuidium intricatum* (MITT.) JAEG., *Thuidium pycnanthellum* C. MÜLL. et *Hypopterygium laricinum* (HOOK.) BRID.]; lac Mugunga, alt. ±1.500 m., berges rocheuses, novembre 1937, n° 8824 (st.).

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE ORIENTALE : Rutshuru, alt. ±1.300 m., bords de la Rutshuru, épiphyte, novembre 1937, n° 8237 (fr.); chutes de la Rutshuru, alt. 1.200 m., rochers dans les embruns, sur les roches dénudées, janvier 1938, n° 9431 (st.).

Cette espèce a déjà été signalée au Congo Belge aux environs d'Albertville; elle est connue d'Afrique Occidentale Française, du Togo, de l'Oubangui et du Gabon.

**Rhacopilum speluncae** C. MÜLL., Linn., XXXIX, p. 425 (1875).

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi, alt. 1.050 m., forêt, épiphyte en tapis, février 1938, n° 9832 B (st.), [en mélange avec *Fissidens sciophyllus* MITT.].

C'est la deuxième fois que cette espèce est trouvée au Congo Belge et dans la même région; elle avait déjà été recueillie dans la région de Bongo, et en Afrique tropicale orientale (Uganda, Usambara, Kilimandjaro).

**Rhacopilum capense** C. MÜLL., Hedw., XXXVIII, p. 124 (1899).

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLLES : entre Rusayo et Kibati, alt. 1.800-1.900 m., forêt sclérophylle à tendance mésophile, au sol, sur un bloc de lave, novembre 1937, n° 8682 (st.).

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : vallée de la Muhe, alt. 1.050 m., rochers, dans les crevasses, octobre 1937, n° 8108 (st.).

Espèce répandue au centre, à l'Est et au Sud de l'Afrique.

**Rhacopilum madagassum** REN., Prod. Fl. Bryol. Madag., p. 265 (1897).

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE ORIENTALE : Rutshuru, alt.  $\pm$  1.250 m., marais de la Rutshuru, rochers, en tapis, décembre 1937, n° 8998 (st.).

Cette espèce, originaire de Madagascar, a déjà été trouvée au Ruwenzori par BEQUAERT et au Kivu par HUMBERT.

## HEDWIGIACEAE

### HEDWIGIDIUM BR. et SCHPR

**Hedwigidium imberbe** BR. et SCHPR, Bryol. Eur., III, Mon., p. 1, tab. 274 (1846).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : selle de Kabara, entre le Karisimbi et le Mikenno, alt. 3.000-3.100 m., clairière herbeuse dans l'étage des *Hagenia*, rochers, en plaques, août 1937, n° 7358 (fr.).

Espèce largement répandue : Europe occidentale, Ceylan, Australie occidentale, Tasmanie, Nouvelle-Zélande, Amérique du Sud, Cameroun, Afrique du Sud et au Congo Belge : région des volcans.

### BRAUNIA BR. et SCHPR

**Braunia secunda** (HOOK.) BR. et SCHPR, Bryol. Eur., III (1846).

*Hedwigia secunda* HOOK., Musc. exot., I, tab. 46 (1818).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : selle de Kabara, entre le Karisimbi et le Mikenno, alt. 3.000-3.100 m., clairière herbeuse dans l'étage

des *Hagenia*, rochers, août 1937, n° 7356 B (st.), [en mélange avec *Trichostomum cylindricum* (BRUCH.) C. MÜLL.].

Espèce à large distribution : Mexique, Bolivie, Inde, Afrique tropicale orientale, Afrique méridionale; au Congo : région des volcans, Ruwenzori et au Ruanda : forêt de Rugege.

## LEUCODONTACEAE

### ANTITRICHIA BRID.

***Antitrichia kilimandjarica*** BROTH., Engl. Bot. Jahrb., XXIV, p. 254 (1897).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : selle de Kabara, entre le Karisimbi et le Mikenno, alt. 3.000-3.100 m., étage des *Hagenia*, épiphyte en coussinets sur les branches d'*Hagenia*, août 1937, n° 7338 (fr.); entre Kabara et le Rukumi, versant nord du Karisimbi, alt. 3.200 m., étage des *Hagenia*, épiphyte sur *Hagenia*, août 1937, n° 7387 B (fr.), [avec *Hypnum cupressiforme* L.]; Karisimbi, alt. 4.000 m., épiphyte sur *Seneçons* arborescents, août 1937, n° 7405 (fr.); versant nord du Karisimbi, alt. 4.000 m., bosquets de *Senecio*, épiphyte en énormes pelotes, août 1937, n° 7424 (fr.).

Distribution : mont Kenya, mont Elgon, Kilimandjaro, région des volcans, Ruwenzori.

### PTEROGONIUM Sw.

***Pterogonium ornithopodioides*** LINDB. *forma*, Oefv. at. K. Vet. Ak. Forh., p. 411 (1863).

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. — GROUPE CENTRAL : versant nord du Mikenno, alt. 2.800 m., vers la limite inférieure de l'étage des *Hagenia*, épiphyte sur *Olea*, en plaques, août 1937, n° 7488 (st.).

OBSERVATION. — Il s'agit de la forme à rameaux effilés, signalée précédemment par DIXON <sup>(1)</sup> et par THÉRIOT <sup>(2)</sup>.

Espèce répandue en Californie, en Europe, en Syrie et en Afrique : Afrique du Nord, Madère, Canaries, Abyssinie, Afrique tropicale orientale, Madagascar, Afrique du Sud; au Congo Belge et au Ruanda : région des volcans et forêt de Rugege.

(1) DIXON, H. N., The mosses collected by the Smithsonian African Expedition 1909-1910 [*Smith. Musc. Coll.*, LXIX, 2, p. 22 (1918)].

(2) THÉRIOT, I., Flore bryologique de Madagascar [*Soc. Havr. Et. Div.*, 2<sup>e</sup> contr., p. 129 (1922)].