

LOCALISATION DES RÉCOLTES

L'exploration du Parc National de la Garamba s'effectua dans des régions déterminées, appelées cellules biologiques, et représentatives des divers biotopes caractérisant le pays.

Certaines récoltes furent réalisées en dehors des cellules, au cours d'exploration en tentacules. Ce procédé permet une extrapolation des données obtenues en ne laissant qu'une faible marge d'erreur.

L'absence de population indigène dans la réserve naturelle intégrale permettait difficilement l'identification toponymique des lieux; aussi, lorsque la toponymie indigène faisait défaut, a-t-on dû recourir à des désignations conventionnelles.

Les chiffres romains I et II précédant la localisation conventionnelle, signifient cellule biologique I et cellule biologique II.

Les lettres suivant l'indication de la cellule se rapportent au lieu de la récolte et les chiffres au milieu.

La première cellule biologique fut divisée en trois régions désignées par les lettres a, b et c (v. carte n° 1). La deuxième cellule fut, elle, fictivement divisée en carrés de deux kilomètres de côté, déterminés par des lettres placées en abscisses et en ordonnées (v. carte n° 2). Le type de milieu exploré se place au troisième rang de la désignation par des chiffres qui se répètent pour tous les milieux identiques.

Exemple :

II/fc/14,

qui signifie : deuxième cellule biologique, carré fc, c'est-à-dire à proximité de la rivière Garamba, mare eurytherme, peu profonde, alimentée par les crues et les eaux pluviales, s'asséchant complètement en saison sèche.

Outre la localisation, il est ainsi possible de connaître la nature du milieu dans lequel la récolte a été effectuée. Toutefois, les désignations ayant été établies antérieurement à la prospection, elles n'ont donc qu'un caractère indicatif et non descriptif.

Le même procédé fut appliqué aux récoltes réalisées au cours de la troisième période de l'exploration, mais la localisation fut alors déterminée par un nom de rivière, d'un inselberg ou par référence aux pistes servant aux déplacements (v. carte n° 3).

Certaines localités ne figurent pas sur les cartes, elles sont reprises dans la liste des pages 9 et suivantes.

Étant
les statio
et 1.060 m

I/a. — Va l

Vers

en pent

de 2 à

à enviro

I/a/1. — S a

Bois

la régio

I/a/2. — M a

Mare

dans un

ados de

dicole. I

I/a/3. — G a

Galer

en lisièr

I/a/3'. — R I

Eau

Fond roc

I/a/3^a. — A l

Régio

dense av

I/a/3M. — M

Dépre

retrait d

I/a/4. — ' ,

Parti

de la riv

arbusif

I/a/p. — D è

Dépre

eaux de

compre

(1) Voir
Nat. Congo I

Étant donné les faibles écarts d'altitude, celle-ci n'est précisée que pour les stations les plus élevées. Toutes les stations sont situées entre 710 et 1.060 m ⁽¹⁾.

CELLULE BIOLOGIQUE I ET RÉGIONS AVOISINANTES.

Dans le Parc National de la Garamba.

I/a. — Vallée de l'Aka.

Versant orienté vers l'Ouest. Côté moins élevé que le versant opposé, descendant en pente douce vers la rivière. Fond de la vallée étroit, berges abruptes variant de 2 à 4 m de hauteur. Emplacement de l'abri climatologique. Celui-ci était situé à environ 100 m de la rivière, sur un promontoire peu élevé.

I/a/1. — Savane arbustive sur argile latéritique.

Boisement de densité moyenne, d'une hauteur maximum de 5 à 6 m, couvrant la région à l'Est de l'abri et s'étendant au Nord et au Sud.

I/a/2. — Mare semi-temporaire.

Mare complètement asséchée pendant deux mois tout au plus de l'année, située dans une dépression, en bordure de la rivière Aka, dont elle est séparée par un ados de sables alluvionnaires. Végétation aquatique, frange de végétation paludicole. Pas d'ombrage.

I/a/3. — Galerie forestière de la rivière Aka.

Galerie forestière sèche à *Irvingia Smithii* Hook f. Rideau étroit, à taillis dense en lisière.

I/a/3'. — Rivière Aka.

Eau courante de 8 à 12 m de large, sous couvert forestier à peu près continu. Fond rocheux ou de sable.

I/a/3^a. — Aka aval.

Région en bordure de la rive gauche de la rivière Aka. Savane arbustive assez dense avec îlots de *Parinari curatellifolia* PLANCH ex BENTH.

I/a/3M. — Mare temporaire.

Dépression, sans couvert, dans un ancien lit de la rivière Aka et isolée lors du retrait des eaux de crues.

I/a/4. — ' , " , "' , anses de la rivière Aka.

Parties exondées environ huit mois par an, créées par la modification du cours de la rivière. Dépôts de sables alluvionnaires en surface. Végétation ligneuse, taillis arbustif en lisière. Petites mares persistantes sténothermes sous couvert forestier.

I/a/P. — Dépression marécageuse.

Dépression dans un vallonnement, asséchée en saison sèche, alimentée par les eaux de ruissellement en saison des pluies. Végétation uniquement herbacée comprenant peu de paludicoles.

(1) Voir aussi : Introduction. Explor. Parc Nat. Garamba, fasc. 1, 1954 (*Inst. Parcs Nat. Congo Belge*, Bruxelles).

I/b. — Vallée de la Mogbwamu.

Versant orienté vers le Sud. Vallée peu encaissée. Emplacement de l'abri climatologique. Celui-ci était placé à 100 m de la rivière, en dehors du vallonnement et séparé de la Mogbwamu par un petit vallon marécageux parcouru par un ruisseau.

I/b/1. — Savane arbustive.

Savane postculturale à boisement clair, sur latérite sénile.

I/b/1^a. — Petite mare temporaire.

Dépression sur dalle latéritique, à découvert. Fond limoneux de 8 à 10 cm d'épaisseur.

I/b/2'. — Ruisseau.

Petit ruisseau drainant les eaux d'un « ndiwili » et ne s'asséchant pas, dans un petit vallonnement tapissé de Cypéracées.

I/b/2". — Mare permanente.

Petite mare abritée sous couvert d'un arbre isolé. Végétation aquatique pauvre.

I/b/2^o. — Marais.

Vallonnement marécageux à *Thalia Welwitschii* RIDLE.

I/b/2^s. — « Ndiwili ».

Dépression partiellement marécageuse sur sol imperméable. Associations d'Herbacées, sans ligneux, à caractère plus paludicole dans l'axe et dans les criques bordières de suintement.

I/b/3. — Rideau forestier.

Etroite frange forestière, plus étendue dans les criques sablonneuses, à dominance d'*Irvingia Smithii* Hook f. Taillis dense, en lisière, notamment d'*Antidesma venosum* TUL., *Canthium* et *Icora*.

I/b/3'. — Rivière Mogbwamu.

Eau courante de 6 à 10 m de largeur, sous couvert forestier discontinu. Fond rocheux (granites et micaschistes) ou sablonneux. Partie basse de la rivière, du type draineur, près de son confluent avec la rivière Aka.

I/b/3". — Mare temporaire.

Mare persistant de 6 à 8 mois par an, devenant marécageuse, puis s'asséchant complètement en saison sèche; alimentée occasionnellement par les crues de la Mogbwamu, mais surtout par les eaux de ruissellement et de suintement. Végétation aquatique et paludicole abondante. Eau boueuse, eurytherme.

I/b/4. — Affleurement granitique.

Affleurement d'environ un hectare, peu élevé, entouré par la savane boisée. Associations d'Herbacées xérophytiques dans les dépressions et fissures.

I/c. — Plateau à savane arbustive claire.

Petit plateau situé sur une crête, entre deux tributaires de la Mogbwamu. Boisement clair, postcultural, strate graminéenne assez dense. Emplacement de l'abri climatologique, installé sur le plateau à plus de 300 m du rideau forestier de la rivière Nambili.

I/c/1. — S a

Savane
breux

I/c/2'. — S

Rav
dense c
essence

I/c/2". — G

Assoc
congen
source.I/c/2^o. — MMar
de la
abondan

I/c/3. — V a

Vall
moke.
isolés.

I/c/4. — G

Gal
de gran
Khaya
coles.

Akam. — C

Sol
frange
ripicole

BM. — B a

Rég
Savane
peu tou

MB. — M c

Crè
de mic
d'*Afzel*
colluvi

ND. — M o

Col
herbeu
avec q

I/c/1. — Savane.

Savane arbustive claire sur pente. Dalle ferrugineuse affleurante en de nombreux endroits. Strate herbacée augmentant de densité vers la Mogbwamu.

I/c/2. — Source de la rivière Nambili.

Ravin encaissé, sous dalle ferrugineuse effondrée. Rideau forestier mésophile dense confiné aux talus du ravin : *Khaya*, *Erythrophloeum*, fond marécageux à essences hygrophiles : *Mitragyna*, *Spondianthus*; taillis assez dense.

I/c/2". — Galerie forestière de la Nambili.

Association de ligneux hygrophiles : *Mitragyna stipulosa* (DC.) O. Ktze, *Ficus congensis* ENGL., *Syzygium guineense* DC., sur fond marécageux, en aval de la source. Herbacées paludicoles et sciaphiles.

I/c/2". — Mare d'eau vive à découvert.

Mare permanente sur socle granitique, située à une interruption de la galerie de la Nambili. Eau eurytherme. Abords marécageux à Herbacées paludicoles abondantes.

I/c/3. — Vallon marécageux.

Vallon sur socle granitique formant tête de source de la rivière Badzamboli moke. Savane herbeuse mélangée d'Herbacées paludicoles; ligneux absents ou isolés.

I/c/4. — Galerie forestière.

Galerie s'étendant en aval de I/c/3. Association forestière dense à hygrophiles de grande taille : *Syzygium guineense* DC., *Phœnix reclinata* JACQ.; en lisière : *Khaya grandifolia* C. DC. Fond marécageux à strate dense d'Herbacées paludicoles.

Akam. — Confluent des rivières Aka et Mogbwamu.

Sol constitué de sables alluvionnaires sur fond hydromorphe. Abords arbustifs; frange forestière des rivières assez dense, mais de largeur réduite. Végétation ripicole de densité variable et irrégulière. Berges de 2 à 3 m de hauteur.

BM. — Basse Mogbwamu.

Région de la Basse Mogbwamu en aval de son confluent avec la rivière Sanza. Savane arbustive claire dégradée. Frange forestière de la Mogbwamu irrégulière, peu touffue, à *Iringia Smithii* Hook f. Affluents marécageux, dénudés.

MB. — Mont Bamangwa (alt. 902 m).

Crête rocheuse dominant de 80 à 100 m les régions avoisinantes. Affleurements de micaschistes. Boisement clair de *Lophira lanceolata* VAN TIEGHEM ex KEY et d'*Azelia africana* SMITH ex PERS. Strate herbeuse basse. Abords arbustifs sur colluvions de pente.

ND. — Mont Ndogo (alt. 815 m).

Colline isolée dominant les régions avoisinantes d'environ 70 m. Végétation herbeuse basse, peu dense. Pas de ligneux. Savane arbustive claire aux abords, avec quelques bouquets isolés de *Parinari curatellifolia* PLANCH ex BENTH.

Hors du Parc National de la Garamba.

I/o. — Camp de Bagbele.

Plateau. Savane postculturale à *Albizia zygia* MAC BRIDE et *Terminalia* cfr. *avicennioides* GULL. et PERR. Emplacement du poste climatologique de base.

I/o/1. — Savane boisée.

Abords du camp de Bagbele. Savane à boisement clair de 5 à 6 m de hauteur, partiellement postculturale et à Mimosées.

I/o/2. — Rivière Nagbarama.

Eau vive sous couvert forestier dense à dominance de *Ficus congensis* ENGL., formant un marécage au Nord-Est du camp, ensuite dévalant sur un affleurement granitique à découvert. Abords à savane boisée dense.

I/o/3. — Savane de pente.

Savane boisée claire d'une hauteur de 5 à 6 m à dominance de Combrétacées, s'étendant du plateau au fond de la vallée de la rivière Aka.

BN. — Basse Nagbarama.

Partie inférieure de la rivière Nagbarama en amont de I/o/2. Frange forestière dégradée à *Mitragyna stipulosa* (DC.) O. KTZE.

MN. — Moyenne Nagbarama.

Cours moyen de la rivière Nagbarama. Galerie forestière dense sur taillis arbustif d'essences sciaphiles.

NAPOKOMWELI. — Rivière.

Petit affluent droit de la rivière Aka. Source dénudée, ensuite frange forestière dense finissant brusquement par une partie marécageuse à Papyrus.

And. — Aka, rive droite.

Savane en aval du confluent des rivières Aka et Mogbwamu. Boisement clair entrecoupé de nombreux affleurements rocheux de faible importance.

KI7. — Affleurement rocheux du km 17.

Grand affleurement granitique à 17 km du camp de Bagbele, sur la route vers Dungu. Milieu eurytherme à associations végétales xérophytiques dans les fissures et dépressions.

DURU. — Source de la rivière Duru.

Frange forestière hygrophile dense et élevée.

BAGBUYO. — Zone de culture en savane boisée.

Village situé au Nord du camp de Bagbele. Cultures actuelles, savanes post-culturelles claires.

KPAIKA. — Rivière.

Traversant la route Dungu-Bagbele à 80 km de cette dernière localité. Grande galerie forestière.

MANDE. —

Au

hygro

jeunes

où exi

PIDIGALA. —

Co

coupé

Sav

Sav

Sav

1. — Sav

Typ

et PER

Sols gé

2. — Sav

Typ

BENTH.

à gris,

3. — Sav

c é e

Lign

dégradé

Ce

4. — Sav

Don

lignex

isolés

Typ

dégradé

la dall

5. — Sav

For

sur alb

forestiè

6. — Gr

Sav

Se

terrain

s'est m

des lig

7. — Savanes paludicoles.

Associations variables de Graminées et de Cypéracées, réparties en ceintures concentriques, dont la composition se modifie en fonction de leur éloignement de la nappe d'eau ou du fond marécageux.

7. — Partie médiane dont la végétation n'est pas constituée par des groupements aquatiques ou semi-aquatiques.

7". — Ceinture suivante habituellement bien précisée.

7". — Ceinture extérieure de transition où les groupements paludicoles et de savanes s'intriquent.

8. — Têtes de source.

Les têtes de source sont dénudées 8, ou arborées 8'. Habituellement de nature marécageuse dans le premier cas; le milieu ne diffère guère de celui du cours de la rivière lorsque la frange forestière n'existe pas.

Les têtes de source, ceintes d'un rideau d'arbres, sont encaissées et constituent un biotope plus confiné. Lorsque la dégradation n'est pas trop avancée, elles présentent un taillis d'essences hygrophiles.

9. — Rivières à cours boisé ou partie boisée de leur cours.

9a. — Type humide. Végétation de grands arbres : *Mitragyna stipulosa* (DC.) O. KTZE, *Ficus congensis* ENGL., *Syzygium guineense* DC., taillis arbustifs de densité variable, strate herbacée. Leur état de dégradation conditionne l'importance des hygrophytes héliophiles.

9b. — Type sec. Frange forestière claire à *Irvingia Smithii* Hook f., *Nauclia*, sp., etc., se présentant par lambeaux fréquemment interrompus. Taillis généralement peu dense ou nul, strate herbeuse fréquemment tapissante.

10. — Rivières à cours dénudé.

Pas de ligneux ou ligneux isolés. Végétation rivulaire souvent aquatique ou paludicole.

11. — Expansions marécageuses.

11a. — Expansion d'une rivière formant un marécage typique avec végétation aquatique et semi-aquatique.

11b. — Expansion formant une nappe d'eau ouverte à bords marécageux.

Formations directement dépendantes de l'étalement du plan d'eau lors des crues, exondées pendant une partie de la saison sèche.

12. — Chenaux.

Les chenaux sont plus rares : ce sont ou un ancien cours de la rivière, ou un bras où l'eau ne devient courante qu'à l'occasion des crues. Ces chenaux sont parfois profonds. Leur régime variable modifie profondément la composition de leur faune dans le temps.

13. — Mares permanentes.

Mares alimentées par les crues et maintenues en saison sèche par les eaux de suintement. Végétation aquatique généralement abondante, abords souvent marécageux.

13s. — Mares permanentes de savane. Celles-ci sont peu fréquentes et alimentées uniquement par les suintements et les eaux de ruissellement.

14. — Mar
Mare
viales. S

14s. —
risée par
thermes
faible ép
des alte
habituell
aquatique

15. — Mar
Maréc
parfois c
tourbeux

16. — Con
Le co
dense ou
marécage

17. — Gale
En ce
Irvingia

a) Va

b) Va

Les a
Les g
ne sont q
représent

18. — Berg

Il s'a
compris
naires. C
Garamba
Panicum

Les mil
par les an
phants, m
empreintes
circulaires
particulier
effectuer l
therme da
températur

14. — Mares temporaires.

Mares eurythermes, peu profondes, alimentées par les crues et les eaux pluviales. S'asséchant complètement en saison sèche.

14s. — Mares temporaires de savane dont la formation est généralement favorisée par la présence de la roche sous-jacente ou d'une dalle ferrugineuse. Eurythermes également, elles sont uniquement alimentées par les eaux pluviales. La faible épaisseur du plan d'eau entraîne leur évaporation rapide, provoquant ainsi des alternances de sécheresse et d'humidité. La végétation aquatique y est habituellement pauvre ou nulle, mais leur repeuplement par des organismes aquatiques est rapide.

15. — Marécages.

Marécages étendus dans le cours d'une rivière, ou dans ses abords immédiats, parfois dans une anse. Papyraies et Herbacées paludicoles abondantes. Fond tourbeux.

16. — Confluents.

Le confluent de deux rivières favorise parfois l'existence d'une végétation plus dense où se mélangent les formations boisées des franges forestières et celles des marécages.

17. — Galeries.

En ce qui concerne la Garamba, seul se rencontre le type de galerie sèche à *Irvingia* et *Nauclea*, dans laquelle on peut trouver deux variantes :

- a) Variante sèche : sous-bois de Graminées et Cypéracées;
- b) Variante humide : sous-bois de paludicoles et de Zingibéracées.

Les autres galeries rentrent dans le cadre des types **9a** et **9b**.

Les galeries sont toutes à un stade plus ou moins avancé de dégradation. Elles ne sont généralement plus qu'une mince frange ripicole et parfois ne sont plus représentées que par quelques arbres en voie de disparition.

18. — Berges.

Il s'agit de la partie abrupte des rives et des parties affaissées de celles-ci, y compris l'ados parfois présent à la suite de l'accumulation des sables alluvionnaires. Cette désignation a principalement été utilisée pour les berges de la rivière Garamba, où souvent les Graminées prennent un grand développement, telle *Panicum maximum* Jacq.

Les milieux **8**, **9**, **10**, **11**, **13**, **14** et **15** sont, de par leur nature, recherchés par les animaux qui s'en servent pour s'abreuver et se baigner. Les Éléphants, masses pesantes, impriment dans les sols mous, boueux, des empreintes pouvant atteindre jusqu'à 0,40 m de profondeur. Les poches circulaires ainsi formées se remplissent d'eau et constituent un biotope très particulier parfois riche en algues et recherché par les batraciens pour y effectuer leurs pontes, ainsi que par des insectes. C'est un biotope eurytherme dans lequel l'eau, lorsqu'il se trouve à découvert, atteint une température dépassant facilement 30°.

CELLULE II ET EXTENSIONS.

Deuxième et troisième périodes de l'exploration.

Les pistes constituant des axes d'exploration, leur kilométrage a été utilisé pour préciser les emplacements explorés; ce renseignement suit l'indicatif de la piste (v. carte n° 3). Exemple : **Pp.K.72**.

Pp. — Piste du Parc.

Piste kilométrique depuis la rivière Dungu (limite Sud) jusqu'à la frontière (limite Nord-Est).

PF. — Piste frontière.

Piste longeant la frontière, de la source de la rivière Garamba jusqu'au mont Embe.

S. — Tronçon Sud-Est depuis l'aboutissement de la piste du Parc jusqu'à la source de la Garamba.

N. — Tronçon Nord-Ouest, depuis l'aboutissement de la piste du Parc, jusqu'à la source de l'Aka.

d. — A droite de l'une de ces pistes.

g. — A gauche.

Les pistes sont désignées sur les cartes annexées par une ligne de petites croix.

o. — Emplacement d'un ancien village.**AR.** — Affleurement rocheux.**DL.** — Dalle ferrugineuse.**R.** — Roches, collines rocheuses et éboulis.

Certaines désignations existantes ont été utilisées en dehors de la cellule biologique II, ainsi que quelques abréviations de lieux.

AKA. — Cours supérieur de la rivière Aka, près du mont Inimvua. Il y a doute sur la désignation de cette rivière, à sa source. Certains indigènes prétendent que cette source, située près du mont Inimvua, serait seulement celle d'un affluent, l'Akawa, tandis que la tête de l'Aka se trouverait près du mont Ngorodoko.

AKA-BIADIMBI. — Cours de la rivière Aka, à 10 km à l'Ouest du Biadimbi.

AKA-GAR. — Confluent des rivières Aka et Garamba au Sud du mont Bawezi.

ANIE. — Affluent gauche de la Mogbwamu, près de sa source au mont Moyo.

ARUATITI. — Affluent droit de la Garamba, près de sa source à la frontière du Soudan.

BAGBELE-MOKE. — Village indigène situé à l'Ouest du mont Uduku, sur la piste Bagbele-mont Embe.

BAGISANA. — Village indigène et petit cours d'eau, affluent de la Pidigala, situé à 5 km au Sud du mont Embe.

BAGUNDA. —
BAMANGWA. —
BAWEZI. —
Garamba
BEREDCA. —
mont
BIADIMBI. —
Nord
BULUKU. —
BWERE. —
limite
CONGO-NIL. —
DEDEGWA. —
DUNGU. —
DUNGUMORI. —
EMBE. — I
à l'Est
GAR. — Le
GAR-NAW. —
INDJOBI. —
de la
INIMVUA. —
près de
INIMVUA SC
IRO. — Co
Yei-Me
ISO. — Ma
étend t
ment p
de la r
trentai
KALIBITI. —
le km
KALIKIMVU. —
piste P
KASSI. — I
Pp.
KASSI-GARA
KEROMA. —

- BAGUNDA. — Inselberg (alt. 990,5 m) dans l'Est du Parc au-dessus du 4^e parallèle.
- BAMANGWA. — Crête rocheuse (alt. 901,9 m), située à peu près sur le parallèle de Bagbele.
- BAWEZI. — Inselberg (alt. 767,2 m), situé au Nord du confluent des rivières Aka et Garamba.
- BEREDUA. — Affluent de la Mogbwamu, prenant sa source à la frontière, au Nord du mont Moyo.
- BIADIMBI. — Vaste affleurement rocheux situé entre les rivières Makpe et Aka, au Nord du parallèle 4°10.
- BULUKU. — Cours d'eau soudanais, affluent de la rivière Iro par 29°50 de longitude.
- BWERE. — Village indigène situé au Nord de Faradje, à quelques kilomètres de la limite Est du Parc.
- CONGO-NIL/AKA. — Crête de partage des eaux, près de la source de la rivière Aka.
- DEDEGWA. — Rivière, dans son cours supérieur près du mont Inimvua.
- DUNGU. — Rivière, dans son cours à hauteur de la Station de Nagero.
- DUNGUMOKE. — Affluent gauche de la Dungu, près de Nagero.
- EMBE. — Inselberg (alt. 1.026,3 m), en territoire soudanais, sur le parallèle 4°40. Bordé, à l'Est, par un grand peuplement de bambous *Oxytenanthera*.
- GAR. — Le cours même de la rivière Garamba.
- GAR-NAW. — Confluent des rivières Garamba et Naworoko, **ee** de la cellule II.
- INDJOBI. — Village en territoire soudanais, sur la route Yei-Meredi, à 1 km à l'Ouest de la piste de raccord.
- INIMVUA. — Inselberg (alt. 1.061,5 m). Sommet le plus élevé, situé au Nord du Parc, près de la frontière.
- INIMVUA/SOEBAN. — Rivière, affluent de l'Iro, au km 38 de la piste PFN.
- IRO. — Cours d'eau soudanais situé près de l'amorce de la piste de raccord à la route Yei-Meridi.
- ISO. — Massif d'*Isoberlinia doka* CRAIB et STAPP. Ce massif, situé en territoire soudanais, étend trois branches jusqu'à la limite frontière, elles ont été désignées respectivement par les chiffres I, II et III; cette dernière est la plus rapprochée de la source de la rivière Garamba et s'avance en territoire congolais sur une superficie d'une trentaine d'hectares.
- KALIBITI. — Rivière, affluent droit de la Garamba, coulant près de la piste depuis le km 56,9.
- KALIKIMVUA. — Rivière, affluent gauche de la Moko, prenant sa source près de la piste PFS.
- KASSI. — Rivière, affluent droit de la Garamba, coulant depuis le km 97,2 de la piste Pp.
- KASSI-GARAMBA. — Confluent des rivières Kassi et Garamba, sur le 4^e parallèle.
- KEROMA. — Rivière, affluent droit de la Pidigala, dans l'extrême Nord du Parc.

- KOKODU. — Rivière, affluent droit de la Pidigala, prenant sa source près du mont Embe.
- KOTSHIO. — Rivière, affluent droit de la Garamba, dans son cours supérieur, près de sa source.
- LEMU. — Village indigène, situé au Sud du mont Otro, à l'Est, en dehors du Parc.
- MABANGA. — Colline tabulaire surmontée par une dalle latéritique près du mont Ndelele. Emplacement du camp III.
- NAGBARAMA ou NAGBALAMA. — Affluent droit de l'Aka, près de Bagbele, hors Parc.
- MAKPE. — Rivière, affluent gauche de l'Aka, prenant sa source près de la piste Pp au km 87,3.
- MAKPE-HAUTE. — Cours supérieur de la rivière.
- MALELI. — Rivière, en territoire soudanais, prenant sa source près du mont Embe.
- MISSE. — Inselberg, dôme rocheux peu élevé, situé dans le Nord du Parc.
- MOBARA. — Rivière, petit affluent gauche de la Gorodo, prenant sa source près du mont Uduku.
- MOGBWAMU. — Rivière, affluent gauche de l'Aka, traversant le Parc dans sa partie Nord et prenant sa source à la crête Congo-Nil au Nord du mont Moyo.
- MOKO. — Rivière, affluent droit de la Garamba, prenant sa source près du mont Ndelele.
- MORUBIA. — Rivière, affluent droit de la Kassi, prenant sa source près du mont Morubia. Dénommée aussi MOLOGBIA.
- MOYO. — Trois collines rocheuses situées près de la limite frontière à hauteur du parallèle 4°30.
- MPAZA ou PAZA. — Inselberg (alt. 878,9 m), situé dans le Nord-Est du Parc.
- NADEGBE. — Cours supérieur d'un affluent de la rivière Iro, au Soudan, à 1 km à l'Est de la source de la Mogbwamu.
- NAKOB0. — Rivière, affluent droit de la Garamba, prenant sa source en **dd** de la cellule II.
- NAKPANGA. — Rivière, affluent droit de la Pidigala, prenant sa source près du mont Embe, à 1 km au Nord-Ouest de la rivière Kokodu.
- NAMBIA. — Petit affluent de la Garamba, situé près du village Tikadzi, hors Parc.
- NAMBIA. — Petit affluent gauche de l'Aka, près de Bagbele.
- NAMBIRA. — Rivière, affluent gauche de la Garamba, limite orientale d'une partie de la cellule II.
- NAMBIRIMA. — Ruisseau situé près du camp II.
- NAWOROKO. — Rivière, affluent gauche de la Garamba, prenant sa source près du point géodésique Naworoko. Explorée à la source et à l'embouchure.
- NDELELE. — Crête de collines et d'éboulis (altitude du point culminant : 900,3 m), située près de la frontière, à l'extrémité de la piste Pp.

NDOGO. —
 NGOROBONG
 OTRO. — I
 PALI. — R
 Sa sou
 PIDIGALA. —
 TAERE. —
 TIKADZI. —
 TORI. — I
 TUNGU. —
 TUNGU. —
 source
 UDUKU. —
 Gorodo
 UTUKURU.
 PFS, a
 WILIBADI. —

NDOGO. — Colline (alt. 815,5 m), située au Sud de Bagbele.

NGOROBONGO. — Rivière, affluent droit de la Pidigala à l'extrême Nord du Parc.

OTRO. — Inselberg (alt. 972,3 m), situé à l'Est en dehors du Parc.

PALI. — Rivière, affluent gauche de la Mogbwamu, située près du camp de Mabanga.
Sa source comprend trois têtes désignées Pali', Pali" et Pali"; à partir du camp.

PIDIGALA. — Rivière, affluent droit de l'Aka, située dans le Nord du Parc.

TAERE. — Rivière, petit affluent gauche de la Mogbwamu, en amont de la Beredua.

TIKADZI. — Village indigène situé à l'Est en dehors du Parc.

TORI. — Rivière en territoire soudanais, prenant sa source à l'Est du mont Ndelele.

TUNGU. — Inselberg, en territoire soudanais, situé au Nord du parallèle 4°20.

TUNGU. — Rivière, affluent droit de la Tori, en territoire soudanais et prenant sa source près du mont Tungu.

UDUKU. — Inselberg (alt. env. 950 m), situé dans le Nord du Parc, entre les rivières Gorodo et Aka.

UTUKURU. — Rivière, affluent droit de la Kotshio, prenant sa source près de la piste PFS, au km 14.

WILIBADI. — Rivière, affluent gauche de l'Aka, au Nord de Gangala-na-Bodio.