

245. — **Microcerus retusus** FABRICIUS var. **rotundatus** AURIVILLIUS.

Mukana, 1.810 m, 19.X.1948; riv. Mubale, 1.480 m, 1-20.V.1947; riv. Lufwa, 1.700 m, 16.I.1948; [Masombwe, riv. Kanakakazi, 1.120 m, 4-16.X.1948]. — 5 ♀♀.

Sonst. Verbreitung. — Südafrika.

246. — **Microcerus fossilis** AURIVILLIUS.

Kateke, s.-affl. Lufira, 950 m, 23.XI-5.XII.1947; Munoi, bif. Lupiala, 890 m, 22-24.VI.1948. — 2 Ex.

Sonst. Verbreitung. — Delagoa Bay. — Ferner : S.W. Afrika : Abachaus, Otjivarongo Distr. (8.I, 1956, G. HOBOM leg.); Zool. Staatssammlg. München, 1 ♂. (Das Exemplar von Kateke stimmt mit diesem Stück gut überein, dasjenige von Munoi ist etwas gestreckter, parallelseitiger und vielleicht das ♀).

Subfam. **BRACHYCERINAE**.Tribus **BRACHYCERINI**.Gattung **BRACHYCERUS** OLIVIER.

OLIVIER, Encycl. meth. Ins., V, 1790, p. 181.

HAAF, Ent. Arb. Mus. Frey, VIII, 1957, pp. 1-274, 343-559, fig. 1-70 (Monogr.).

Typus-Art. — *Curculio apterus* LINNÉ.

Geogr. Verbreitung. — Äthiopische Region, mediterrane Subregion, Mitteleuropa.

Herrn Dr. E. HAAF, Tutzing b. München, der die afrikanischen Arten der Gattung *Brachycerus* monographisch bearbeitete, bin ich für die Bestimmung der nachfolgend aufgeführten Arten dankbar.

247. — **Brachycerus modestus** FÄHRAEUS.

FÄHRAEUS, Öfv. Vet.-Ak. Förh., 28, 1871, p. 52. — HAAF, Ent. Arb. Mus. Frey, VIII, 1957, pp. 94, 522.

scrobipennis FÄHRAEUS, Öfv. Vet.-Ak. Förh., 28, 1871, p. 53.

agrestis MARSHALL, Ann. Natal Gvt. Mus., 5, 1926, p. 265, fig. 1.

rikattensis HESSE, Ann. Soc. Afr. Mus., XXV, 1929, p. 497.

Mukana, 1.810 m, 15-19.I.1948. — 1 Ex.

Sonst. Verbreitung. — Süd-Rhodesien, Mozambique, Transvaal.

248. — **Brachycerus erosicollis** MARSHALL.

MARSHALL, Ann. Mag. Nat. Hist., (10), VII, 1931, p. 416. — HAAF, Ent. Arb. Mus. Frey, VIII, 1957, pp. 116, 484.

Munoi, bif. Lupiala, 800 m, 31.V-2.VI.1948; Kanonga, 700 m, 17-22.II.1949; Kaswabilenga, 700 m, 1-4.XI.1947. — 3 Ex.

Sonst. Verbreitung. — Mozambique, NW-Rhodesien, Tanganyika, Kongo : Meru-Gebiet, Lulua, Kafakumba.

249. — **Brachycerus brevicostatus** FÄHRAEUS.

FÄHRAEUS, Öfv. Vet.-Ak. Förh., XXVIII, 1871, p. 48. — PÉRINGUEY, Denkschr. med. naturw. Ges. Jena, 1908, p. 410. — HAAF, Ent. Arb. Mus. Frey, VIII, 1957, pp. 140, 499, 503.

cinnamomeus PASCOE, Proc. Ent. Soc. Lond., 1888, p. 25.

adustus PÉRINGUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., VI, 1892, p. 72.

Mabwe, 585 m, 2.III.1949. — 1 Ex.

Sonst. Verbreitung. — Natal, Transvaal, Mozambique, N. und S. Rhodesien, Tanganyika, Kenya, Bechuanaland, SW-Afrika, Kongo (Lulua/Sandoa, Elisabethville, Kafakumba).

Stücke von folgenden Fundorten variieren leicht :

Kabenga, 1.240 m, 8.IV.1949; [Masombwe, riv. Kanakakazi, 1.120 m, 4-16.X.1948]; Kateke, s.-affl. Lufira, 950 m, 28.XI-5.XII.1947; Kaziba, 1.140 m, 15.II.1948. — 4 Ex.

250. — **Brachycerus ornatus** DRURY.

DRURY, Illustr. Nat. Hist., II, 1773, p. 63, t. 34, fig. 3. — HAAF, Ent. Arb. Mus. Frey, VIII, 1957, pp. 154, 498.

apterus HERBST (nec LINNÉ), Käfer, VII, 1797, p. 75, t. 101, fig. 1.

granosus GYLLENHAL in SCHÖNHERR, Gen. Spec. Curc., I, 1833, p. 387.

transiens LENGERKEN, Sitz.-Ber. Ges. natf. Freunde Berl., 1914, p. 110.

Kaziba, 1.140 m, 1-6.II.1948; Mabwe, lac Upemba, 585 m, 21-28.VIII.1947, 9.XII.1948; Buye-Bala, 1.750 m, 17-22.IV.1948; Kateke, s.-affl. Lufira, 950 m, 23.XI-5.XII.1947. — 5 Ex.

Sonst. Verbreitung. — Kap-Provinz, Oranjerestaat, Transvaal, Mozambique, Tanganyika, Nord und Süd Rhodesien, Bechuanaland, SW. Afrika, Angola, Kongo-Gebiet.

251. — **Brachycerus apterus** LINNÉ.

LINNÉ, Syst. Nat., ed. X, 1758, p. 386.

HAAF, Ent. Arb. Mus. Frey, VIII, 1957, pp. 156, 498.

Kabwekanono, 1.815 m, 3.IV.1947; Mukana, 1.810 m, 19.X.1948; Lusinga, 1.740 m, 1.XII.1948; id., 1.760 m, 15.XII.1948-3.I.1949; riv. Kamitungulu, 13.VI.1945. — 5 Ex.

Sonst. Verbreitung. — Südafrika.

252. — **Brachycerus annulatus** GERSTAECKER.

GERSTAECKER, Monatsbl. Berl. Ak., 1855, p. 83; PETER's Reise, 1862, p. 305, t. 18, fig. 6. — HAAF, Ent. Arb. Mus. Frey, VIII, 1957, pp. 178, 515.

raffrayi CHEVROLAT, compt. rend. Soc. Ent. Belg., XXVI, 1882, p. 89.

honorabilis BRANCSIK, Jahresh. Nat. Ver. Trencsen Kom., 19, 1897, p. 122, t. 4, fig. 14.

Kamitungulu, 1.700 m, 11.IV.1947; Mubale, tête de source, 1.750 m, 7.IV.1948; Lusinga, 1.760 m, 1-8.XII.1947. — 3 Ex.

Sonst. Verbreitung. — Nördl. Mozambique, Angola, Kongo, Kenya, Tanganyika, NW--Rhodesien, Abessinien, Somaliland.

253. — **Brachycerus moerens** PASCOE.

PASCOE, Trans. Ent. Soc. Lond., 1887, p. 17, t. 2, fig. 6. — HAAF, Ent. Arb. Mus. Frey, VIII, 1957, pp. 184, 494, 495, 511.

divergens PÉRINGUEY, Trans. Ent. Soc. Lond., 1896, p. 187.

Kankunda, 1.300 m, 19-24.XI.1947; Kaswabilenga, 700 m, 3-7.XI.1947. — 2 Ex.

Sonst. Verbreitung. — Nord- und Süd-Rhodesien, Tanganyika, Kenya.

254. — **Brachycerus fischeri** KOLBE.

KOLBE, Arch. Naturg., LXIV, 1898, p. 244. — HAAF, Ent. Arb. Mus. Frey, VIII, 1957, pp. 187, 484.

reductus MARSHALL, Ann. Mag. Nat. Hist., (10), VI, 1931, p. 415.

Mabwe, 585 m, 19.XI. 13-16.XII.1948, 25-28.I, 2.III.1949; Kanonga, 700 m, 16-23.II.1949; Ganza, 860 m, Kamandula, s.-affl. g. Lufira, VI.1949. — 10 Ex.

Sonst. Verbreitung. — Tanganyika, Kenya, NW.-Rhodesien, Kongo (Kafakumba, Katanga, Lukafu/Kinda, Lulua/Kapanga, Kapema/Kipaila).

255. — **Brachycerus deludens** MARSHALL.

MARSHALL, Ann. Mag. Nat. Hist., (10), VII, 1931, p. 415. — HAAF, Ent. Arb. Mus. Frey, VIII, 1957, pp. 190, 484.

Mabwe, 585 m, 17-27.XII.1948; Kanonga, 700 m, 16-28.II, 8.XI.1949; Kaswabilenga, 700 m, 29-30.X.1947, 17-24.I.1949; Kaziba, 1.140 m, 19-27.II.1948. — 7 Ex.

Sonst. Verbreitung. — Nyassaland, Tanganyika, NW.-Rhodesien, Kongo (Kafakumba, Lopoi, Bassin Lukuga, Lulua, Katanga).

256. — **Brachycerus spiniger** FABRICIUS.

FABRICIUS, Syst. Eleuth., II, 1801, p. 413. — GYLLENHAL in SCHÖNHERR, Gen. Spec. Curc., I, 1833, p. 439; V, 2, 1840, p. 691. — HAAF, Ent. Arb. Mus. Frey, VIII, 1957, pp. 184, 486.

kumbanensis QUEDENFELDT, Berl. Ent. Z., XXXII, 1888, pp. 192, 284.

Kamitungulu, 1.700 m, 21.I.1948; Ganza, 860 m, Galeriewald Lukoka, 10.VI.1949. — 2 Ex.

Sonst. Verbreitung. — Im Kongogebiet sehr verbreitet, ausserdem Westafrika (Guinea, Togo, Kamerun), ferner Ruanda, Kivu, Tanganyika.

257. — **Brachycerus microderes** MARSHALL.

MARSHALL, Ann. Mag. Nat. Hist., (10), VII, 1931, p. 420. — HAAF, Ent. Arb. Mus. Frey, VIII, 1957, pp. 199, 487.

Kanonga, 700 m, 17-22.II.1949; Kilwezi, 750 m, 2-7.VIII, 23.VIII-4.IX.1948. — 6 Ex.

Sonst. Verbreitung. — Tanganyika, Uganda, Kongo (Bambesa, Ituri, Luma, Kafakumba, Ubangi, Uele, Dungu, Lulua, Kivu, Libenge, Mongbwalu, Mahagi-Niarembe, Bassin Lukuga, Lulua), Franz. Kongo.

258. — **Brachycerus maculipes** CHEVROLAT.

CHEVROLAT, Compt. rend. Soc. Ent. Belg., XXVI, 1882, p. 89. — HAAF, Ent. Arb. Mus. Frey, VIII, 1957, pp. 304, 483.

strumosus PASCOE, Trans. Ent. Soc. Lond., 1887, p. 16, t. 2, fig. 8.

schoenherri PÉRINGUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., IV, 1888, p. 149, t. 2, fig. 8.

mamillatus AURIVILLIUS, Ark. Zool., 18 A, 22, 1926, p. 1, fig.

Mabwe, 585 m, 12.I.1949; Kaswabilenga, 700 m, 29-30.X.1947. — 2 Ex.

Sonst. Verbreitung. — Abessinien, Kenya, Tanganyika, Kamerun, Togo, Kongo (Region de Sassa, Lulua, Lomami, Kivu, Parc Nat. Albert, Lualaba, Ituri, Mukonkoto, Katanga, Kafakumba, Kibimbi, Albertville), Ruanda.

259. — **Brachycerus basilewskyi** MARSHALL.

MARSHALL, Ann. Mus. Congo Belg., XL, 1955, p. 259, fig. 3. — HAAF, Ent. Arb. Mus. Frey, VIII, 1957, pp. 241, 534, 536.

Lusinga, 1.760 m, 22-23.IV.1949; Kaziba, 1.140 m, 19-27.II.1948. — 2 Ex.

Sonst. Verbreitung. — Tanganyika, Upemba, Ruanda-Urundi.

260. — **Brachycerus dorsomaculatus** QUEDENFELDT.

QUEDENFELDT, Berl. Ent. Z., XXXII, 1888, p. 193. — MARSHALL, Ann. Mag. Nat. Hist., (10), VI, 1930, p. 573. — HAAF, Ent. Arb. Mus. Frey, VIII, 1957, pp. 242, 525.

Kankunda, 1.300 m, 19-24.XI.1947. — 1 Ex.

Sonst. Verbreitung. — Tanganyika.

261. — **Brachycerus clitellatus** FÄHRAEUS var.

FÄHRAEUS, Öfv. Vet.-Ak. Förh., XXVIII, 1871, p. 56. — HAAF, Ent. Arb. Mus. Frey, VIII, 1957, pp. 353, 534.

Gorges de la Pelenge, 1.150 m, 21-31.V.1947. — 1 Ex.

Sonst. Verbreitung. — Südafrika (Caffraria, Transvaal, Kap Provinz, Orangefreistaat, Basutoland).

262. — **Brachycerus rectinasus** HAAF.

HAAF, Ent. Arb. Mus. Frey, VIII, 1957, pp. 361, 536.

Riv. Kafwi, affl. dr. Lufwa, 1.780 m, 15.III.1948; Mubale, 1.480 m, 14-16.V.1947. — 2 Ex.

Sonst. Verbreitung. — NW.-Rhodesien, Angola, Kongo (Kapanga, Elisabethville, Sandoa, Kafakumba, Lulua, SO.-Katanga).

Tribus **BROTHEINI.**Gattung **SYNTHOCUS** SCHÖNHERR.

SCHÖNHERR, Gen. Spec. Curc., VI, 2, 1842, p. 408. — MARSHALL, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XVIII, 1907, p. 89; Ent. Arb. Mus. Frey, VII, 1956, pp. 424-438 (Best-Tabelle). — HAAF, Ent. Arb. Mus. Frey, VIII, 1957, p. 11.

Daulaxius PASCOE, Trans. Ent. Soc. Lond., 1887, p. 333.

Typus-Art. — *S. truncatus* BOHEMAN.

Heimat. — Süd- und Südwestafrika; Kongo.

263. — **Synthocus viduus** HUSTACHE.

HUSTACHE, Rev. Zool. Bot. Afr., XXX, 1937, p. 182. — HAAF, Ent. Arb. Mus. Frey, VII, 1956, p. 428, fig. 3.

Gorges de la Pelenge, 1.150 m, 21-23.VI.1947; Lusinga, 1.760 m, 28.XI-6.XII.1947; Mabwe, 585 m, 17-27.XII.1948; Kaswabilenga, 700 m, 16.X.1947. — 4 Ex.

Sonst. Verbreitung. — Lulua, Kafakumba, Sandoa.

Tribus **DINOMORPHINI.**Gattung **BRACHYGEROPSIS** AURIVILLIUS.

AURIVILLIUS, Öfv. Svensk. Ak. Handl., XLIII, 1885, p. 24.

Xenostes SIMPSON, in JAMESON, Story Rear Column. Emir PASCHA Relief Exped. 1890, p. 424.

Typus-Art. — *Brachycerus verrucosus* FABRICIUS.

Geogr. Verbreitung. — West- und Ostafrika.

264. — **Brachyceropsis verrucosus** FABRICIUS.

FABRICIUS, Ent. Syst., I, 2, 1792, p. 81.

tuberculosis GYLLENHAL in SCHÖNHERR, Gen. Spec. Curc., I, 1833, p. 438.

Jamesoni SIMPSON, loc. cit., p. 424, (*Xenostes*).

Mabwe, 585 m, 1-12, 19-21.VIII.1947, 2.III.1949. — 5 Ex.

Sonst. Verbreitung. — Guinea, ausserdem mit einer Variante in Kenia vorkommend.